



viveros
del sureste

Especialidad en frutales, almendros y olivos



2027





**VARIEDADES DIVERSAS DE ALMENDROS,
FRUTALES, OLIVOS Y PORTAINJERTOS**

Almendro	6-8
Albaricoque	9
Melocotón	10
Olivo	11-12
Ciruela	13
Manzano	14
Peras y otras variedades	15

PSB

Albaricoques	18-25
Ciruela	26-33
Melocotón	30-39
Paraguayo y Nectarina	40-73

COT

Albaricoque	76-84
Cereza	85-89
Ciruela	90-94

CEBAS FRUITS

Albaricoque	96-97
Tablas de Floración y Maduración	97
Almendro	98

FRUTIMIDA

Calendario	100
Paraguayo	101-105
Melocotón	106-112
Nectarina	113-115



EFE VIVEROS DEL SURESTE es una empresa familiar productora de plantas de vivero a raíz desnuda y en maceta, con especialidad en frutales, almendros, olivos y otras especies, avalada con sus más de 50 años de experiencia con excelentes resultados.

Nuestras instalaciones y fincas están asentadas en el Noroeste de la región de Murcia, zona de gran tradición viverística. Este enclave geográfico situado a unos 900 m de altitud hace que las plantas de nuestros viveros se desarrollen con una gran resistencia a plagas y enfermedades siendo producidas en fincas propias, en terrenos vírgenes los de raíz desnuda y en sustrato de altísima calidad para las plantas de maceta, por tanto, de mejor calidad que las que se obtienen en otras latitudes geográficas de menor altitud.



Fundador
SALUSTIANO FERNÁNDEZ

Hoy por hoy contamos con 35.000 m² de modernas instalaciones para el cultivo de plantas en maceta (invernaderos de todo tipo) durante todo el año, las cuales renovamos constantemente en un claro esfuerzo por mejorar las condiciones de cultivo, con la finalidad de obtener plantas sanas y vigorosas.

Además, contamos con más de 100 hectáreas de terrenos vírgenes para la producción de plantas a raíz desnuda en campo. Disponemos también de nuestros propios setos madre, donde seleccionaremos los plantones y variedades de mejor calidad de las múltiples y diferentes especies.

Estamos en constante desarrollo, incorporando a nuestra empresa los mejores profesionales para el desarrollo de nuestra actividad, con un gran equipo humano y técnico que velan constantemente por el buen resultado y calidad de nuestras plantas.

Para ello contamos con licencias para multiplicación y producción de los principales editores y obtentores tales como PSB, COT INTERNACIONAL, CEBAS-CSIC, CITA, FRUTIMIDA y las representadas por GESLIVE.


Al mismo tiempo ofrecemos a nuestros clientes total información y asesoramiento técnico relacionado con las plantaciones desde la selección de variedades y patrones, además de los trabajos de plantación, riegos, fertilización y tratamientos fitosanitarios.

VIVEROS DEL SURESTE pertenece a un grupo en el cual está EMA GOLDEN TREASURE S.L., una nueva empresa creada para el complemento de nuestra actividad viverística y frutícola contando con 150 ha. de almendros en secano, 60 ha. de frutales diversos en regadío y 10 ha. de olivos en regadío.

Además de todo lo descrito anteriormente, VIVEROS DEL SURESTE ha participado en numerosos proyectos con organismos públicos y privados para el avance y desarrollo en bien del sector agrícola, en las que destacamos, como la única empresa privada que ha participado junto con el organismo público CEBAS-CSIC en el proyecto MARS (Margen Assailed Resistance of Sharka), que tiene como objetivo el desarrollo de marcadores moleculares asociados a la resistencia de la Sharka en variedades resistentes. El mismo ha sido coordinado por el INRA de Burdeos (Francia) y en el que participan 17 organismos de investigación y empresas de 8 países (Bulgaria, Francia, Italia, España, Grecia, República Checa, Rumanía y Turquía).

Para una información más detallada, puede visitar nuestra página web:

www.viverosdelsureste.com



viveros
del sureste

VARIEDADES
DIVERSAS
DE ALMENDROS,
FRUTALES
OLIVOS Y
PORTAINJERTOS

Almendros
Olivos
Frutales
Porta-injertos

RAMILLETE



CARACTERÍSTICAS

Árbol	De vigor medio-alto y rápida entrada en producción, similar a Ferragnes. Aguanta bien el ataque de hongos, siendo de las variedades más tolerantes a enfermedades criptogámicas.
Floración	Muy tardía en zonas medias, primera quincena de marzo. Tiene una floración de notable intensidad, autocompatible y de gran cuaje.
Maduración	2 al 12 de Septiembre en zonas medias.
Fruto	Es de cáscara semi-dura con el grano alargado y estrecho, con unos rendimientos muy altos en relación cáscara / grano, 35-38% y muy baja presencia de frutos dobles, inferior al 5%.
Valoración	Variedad de rápida entrada en producción y muy estable.

GARRIGUES



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte medio-alto. Buena ramificación
Floración	Media. Autoincompatible. Puede polinizarse con Desmayo, Ramillete, Atocha y otras coincidentes en floración..
Maduración	Media
Fruto	Es de cáscara semi-dura con el grano alargado y estrecho, con unos rendimientos muy altos en relación cáscara / grano, 35-38% y muy baja presencia de frutos dobles, inferior al 5%.
Valoración	Variedad de excelente calidad y buena producción.

ATOCHA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	De vigor medio-alto y rápida entrada en producción, similar a Ferragnes. Aguanta bien el ataque de hongos, siendo de las variedades más tolerantes a enfermedades criptogámicas.
Floración	Muy tardía en zonas medias, primera quincena de marzo. Tiene una floración de notable intensidad, autocompatible y de gran cuaje.
Maduración	2 al 12 de Septiembre en zonas medias.
Fruto	Es de cáscara semi-dura con el grano alargado y estrecho, con unos rendimientos muy altos en relación cáscara / grano, 35-38% y muy baja presencia de frutos dobles, inferior al 5%.
Valoración	Variedad de rápida entrada en producción y muy estable.

DESMAYO



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte medio .Buena ramificación. Vigor medio-alto
Floración	Media. Autoincompatible . Puede polinizarse con Ramillete, Garrigues y otras coincidentes en floración
Maduración	Media
Fruto	Cáscara dura, grano alargado. Rendimiento 26-28%. No hay dobles.
Valoración	Variedad de excelente calidad y buena producción.

MARCONA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte medio con ramificación muy abundante. Vigor medio. Origen: Zona levantina. Probablemente Alicante.
Floración	Media. Autoincompatible. Puede polinizarse con 'Doble Fina', 'Blanquerna', 'Carreró', etc.
Maduración	Media
Fruto	Cáscara dura. Grano redondo y algo globoso. Rendimiento 25-27%. Prácticamente sin pepitas dobles.
Valoración	Variedad referente en calidad de la almendra. Exigente en poda. Medianamente sensible a la mancha ocre. Productiva.

SOLETA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso de porte abierto y fácil de formar.
Floración	Tardía, primera quincena de marzo en zona media.
Maduración	10 al 21 de Septiembre en zonas medias.
Fruto	Es una almendra de cáscara dura y muy valorada por asemejarse a Largueta, perteneciendo a ese selecto club de almendras NO comunes. Esta almendra alargada es de gran rendimiento y tiene muy pocos frutos con semillas dobles.
Valoración	Es un árbol fácil de trabajar, muy productivo y fácilmente mecanizable.

FELIPO



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte vigor medio-alto, poco ramificado
Floración	Tardía. Autocompatible. Buena resistencia al frío
Maduración	Media
Fruto	Cáscara semi-dura, rendimiento 33-35%.
Valoración	Rápida entrada en producción y buena regularidad.

BELONA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso de porte abierto y fácil de formar.
Floración	Tardía, sobre primeros de marzo, dependiendo de las zonas. Autocompatible.
Maduración	2 al 12 de Septiembre en zonas medias.
Fruto	Es una almendra de cáscara dura con un rendimiento medio de 29-33% en grano, se parece mucho la semilla de Marcona por lo que está valorada en este sentido. Tiene una muy baja presencia de frutos dobles.
Valoración	Es un árbol muy simple e intuitivo, muy fácil de trabajar, bastante productivo y fácilmente mecanizable.

GUARA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte y vigor medios. Poco ramificado.
Floración	Tardía. Autocompatible. Cierta resistencia al frío.
Maduración	Temprana
Fruto	Cáscara semi(dura). Grano amigdaloid(acorazonado. Rendimiento 35-40%. Frutos dobles 10-20%.
Valoración	Rápida entrada en producción. Regularidad en la producción. Sensible a la mancha ocre.

FERRADUEL



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte abierto, muy ramificado. Vigor alto en regadío y medio en seco. Origen: Obtenida en el INRA francés por cruzamiento 'Ai' x 'Cristomorto'. Variedad autoestéril.
Floración	Tardía. Autoincompatible. Se poliniza con 'Ferragnes' y otras variedades de floración tardía, excepto 'Ferralise'. Cierta resistencia al frío.
Maduración	Tardía
Fruto	Cáscara dura. Grano largo y ancho. Rendimiento 26-32%. Sin frutos dobles.
Valoración	Tolerante a las enfermedades criptogámicas. Buena productividad en regadío.

LAUREANNE



CARACTERÍSTICAS

Árbol	De vigor medio-alto y rápida entrada en producción, similar a Ferragnes. Aguanta bien el ataque de hongos, siendo de las variedades más tolerantes a enfermedades criptogámicas.
Floración	Muy tardía en zonas medias, primera quincena de marzo. Tiene una floración de notable intensidad, autocompatible y de gran cuaje.
Maduración	2 al 12 de Septiembre en zonas medias.
Fruto	Es de cáscara semi-dura con el grano alargado y estrecho, con unos rendimientos muy altos en relación cáscara / grano, 35-38% y muy baja presencia de frutos dobles, inferior al 5%.
Valoración	Variedad de rápida entrada en producción y muy estable.

FERRAGNES



CARACTERÍSTICAS

Árbol	De vigor medio con una rápida entrada en producción y altamente productivo, muy fácil de trabajar. Aunque necesita polinización cruzada es un árbol muy fácil de polinizar y altamente productivo, superando en este aspecto a muchas variedades auto compatibles. Poliniza bien con Ferraduel.
Floración	Tardía, mediados de marzo en zona media y muy resistente al frío. Maduración. Para el 5 al 17 de Septiembre en zona media.
Fruto	Es de cáscara semidura, alargada y de gran rendimiento que está siempre en el entorno del 32-24% en cuanto a la relación cáscara/grano, y no presenta nada de semillas dobles. La semilla es de muy buena calidad, muy dulce y valorada.
Valoración	Es una variedad muy difundida que destaca por su alta productividad y gran rendimiento. Al igual que Guara lleva mucho tiempo entre nosotros y es sobradamente conocida en todos sus secretos y en general satisface bastante a los productores.

BULIDA

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Árbol de gran talla, porte abierto y muy vigoroso. Requiere de aclareo para obtener un tamaño adecuado de fruto, ya que la floración es muy abundante.
Floración	Auto fértil, de floración temprana.
Maduración	Se recolecta a principios de junio.
Fruto	Los albaricoques de la variedad Bulida son de tamaño grade y con un surco poco profundo, su piel es amarilla, muy jugoso, azucarado y algo acidulado. Muy apreciado por la industria conservera. Buena conservación.

MONIQUI

CARACTERÍSTICAS

Árbol	El albaricoquero Moniquí es un árbol de porte semi erecto con unas bajas producciones, por lo que ya no se emplea como variedad comercial.
Floración	El albaricoquero Moniquí es de floración temprana, similar a Pepito Rubio y una semana antes que Búlida. Requiere polinización cruzada (Búlida, Pepito, Canino y otros que florezcan en época similar).
Fruto	El albaricoque Moniquí es de color blanco amarillento con la pulpa blanca. Se recolecta 15 días después de Búlida. El fruto es de tamaño superior a este y de una calidad superior a cualquier otra variedad.

PEPITO DE RUBIO

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso y porte semierguido.
Floración	Semi tardía y abundante. Prácticamente a la vez que el Moniquí.
Fruto	Calibre grande, la piel es sonrosada algo anaranjada. Carne blanca cremosa, dulce y de buena calidad.
Recolección	Segunda quincena de junio.

MICHEL DE CASTELLÓN

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Árbol que crece de forma vigorosa y es muy productivo a la hora de hacer fruto.
Maduración	La fecha de recolección de este fruto es en el mes de Junio.
Fruto	La piel de sus frutos es suave, aterciopelada y de color amarilla y roja y los frutos son de tamaño grande.

ARQUES

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso, alta producción.
Floración	Tardía, mediados de marzo.
Fruto	Tamaño mediano, color amarillo, muy bueno de comer.

REAL FINO

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Es un árbol de porte semi erecto con unas bajas producciones, por lo que ya no se emplea como variedad comercial.
Floración	Floración temprana, similar a Pepito Rubio y una semana antes que Búlida.
Fruto	Es de color blanco amarillento con la pulpa blanca. Se recolecta 15 días después de Búlida. El fruto es de tamaño superior a este y de una calidad superior a cualquier otra variedad.

CATHERINE

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso y muy productivo y regular.
Floración	Época media. Flor rosácea.
Maduración	Se recolecta en la segunda quincena de Julio.
Fruto	Su calibre es medio a grueso según carga, aclareo y situación del árbol. Redondeado, regular y simétrico. Pulpa amarilla, consistente, jugosa y perfumada ligeramente acidulada, de calidad gustativa buena. Hueso adherente. Ausencia de huesos abiertos.

CARSON

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigor medio y porte abierto.
Producción	Media - Alta
Calibre	AA- AAA
Floración	Tardía
Fruto	Amarillo, con chapa rosácea. Buena calidad gustativa.
Recolección	AGOSTO

ANDROS

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte abierto y vigoroso.
Floración	Tardía
Maduración	Agosto
Fruto	Calibre alto. AA-AAA. Amarillo total, terminado en punta muy jugoso y dulce.
Recolección	Agosto

CAMPIEL AMARILLO

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Porte abierto y vigoroso.
Floración	EXTRATARDIA
Maduración	Septiembre- Octubre
Fruto	calibre AA-AAA. Amarillo y muy buena manipulación. Gran calidad gustativa.

ROMEA

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigor medio y porte semiabierto. Producción buena y regular. Bastantes sensibles al oídio
Floración	ÉPOCA MEDIA A SEMITARDIA. Flor rosácea.
Maduración	Se recolecta a finales de junio o en la primera quincena de Julio. Calibre AA.
Fruto	Calibre medio. Redondeado, algo asimétrico. Piel de color amarillo claro. Sensible a rozaduras. Jugosa, azucarado, de buena calidad gustativa. Hueso adherente con tendencia a abrirse algunos años.

BABY GOLD 6

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso. Porte semiabierto.
Producción	Alta
Calibre	AAA
Floración	Media tardía
Fruto	Amarillo con chapa rojiza. Excelente calidad gustativa.
Recolección	JULIO

MIRAFLORES

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Árbol de porte erecto muy vigoroso.
Floración	Extra- tardía
Maduración	Septiembre
Fruto	Calibre AAA-AAAA. Amarillo total, redondo, gran firmeza y aguante. Buen sabor gustativo

ARBEQUINA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigor bajo, de porte abierto y con densidad de copa media, con inflorescencias largas y un número medio de flores.
Hoja	Las hojas son cortas, elípticas, de anchura media y curvatura apuinástica.
Fruto	Es esférico y simétrico, de paso bajo, el diámetro transversal máximo está desplazado hacia la base, que está truncada. El ápice es redondo, sin pezón. Las lenticelas son pequeñas y escasas. Su superficie es rugosa, con un número medio de surcos.
Cultivo	Esta variedad resiste bien los suelos salinos y el frío. La época de floración es media, con una productividad constante y elevada, con frutos ricos en aceite de gran calidad, siendo ese su destino.

MANZANILLA DE CUQUILLO



CARACTERÍSTICAS

Esta variedad de olivo tiene un fruto pequeño y parecido a una manzana, de ahí el nombre. Es de maduración media, es la más extendida para consumo en mesa.

La manzanilla es una de las más conocidas internacionalmente gracias a la gran calidad que posee. El aceite virgen extra con esta variedad tiene un color especialmente amarillo brillante y muy peculiar, concentrando multitud de elementos nutricionales y escasa proporción de ácidos grasos lo que favorece una fácil digestión...

En cuanto a sus características organolépticas es un aceite de oliva frutado, con bajo amargor y muy poco picantes. El aroma es suave, agradable y equilibrado, con un toque a hierba fresca, manzana, tomate verde y plátano.

PICUAL



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoro de porte abierto y copa espesa. Los ramos fructíferos son de entrenudos cortos y muy ramificados.
Hoja	De tamaño medio, corta (a veces larga) y estrecha. De curvatura nula y de forma elíptico-lanceolada.
Fruto	Maduración tamaño medio, con forma elíptica y asimétrica. El ápice es ligeramente apuntado que en ocasiones presenta un pequeño pezón. Diámetro trasversal máximo centrado.

CHANGLOT



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigor medio, porte abierto y densidad de la copa espesa.
Valoración	Aptitud aceite, productividad alta, alternancia vecera, enraizamiento alto, rendimiento graso alto, calidad del aceite alta, maduración media y resistencia del desprendimiento alto

BLANQUETA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigor bajo, porte erguido y densidad de la copa media.
Fruto	Peso medio bajo, forma esférica, ligeramente asimétrico, color rojo vinoso y en la maduración negro.
Variedad	Aptitud aceite, productividad alta, alternancia contante, entrada en producción precoz, enraizamiento alto rendimiento graso alto, calidad de aceite media, floración tardía, maduración media y resistencia al desprendimiento alta.
Tolerancia frente a:	Heladas alta, repilo baja, mosca del olivo media, sequía alta, tuberculosis baja y verticillium muy baja.
Valoración	La maduración es escalonada. Producción en racimos. Variedad muy productiva, con un aceite afrutado, algo amargo y de muy baja estabilidad.

GORDAL



CARACTERÍSTICAS

Origen	Sevilla. Área de cultivo: Provincia de Sevilla.
Planta	Vigor: Medio. Porte: Erguido Vegetación: Ramos gruesos, más bien largos, con pocas ramificaciones. Frutos aislados y bien esparcidos. Color madera joven: Gris algo ocráceo
Hoja	Forma: Casi recta, alargadas, polimorfas, algo ensanchadas uniformemente. Color: Haz verde oscuro, envés plateado verdoso. Forma: Algo alargada, ovalada-acorazonada, en algunas algo asimétrica. Volumen: Medio 12,8 g. Rendimiento graso: 22,1% Pulpa: 86,5% Variedad sensible a la sequía y resistente al frío. Árbol de vigor medio y escasa productividad. Entrada en producción media. Polen autoincompatible. Oliva de gran tamaño, de uso exclusivo para aderezo en verde.

CORNICABRA



CARACTERÍSTICAS

Variedad más adaptada por su rusticidad, especialmente su resistencia al frío. Su fruto, de elevado rendimiento, aporta unos aceites muy estables y apreciados.	
Denominación	Por su cultivo en emplazamientos diversos recibe numerosas acepciones, todas ellas en referencia a su peculiar fruto en forma curvada a modo de cuerno: corniche, cornezuelo, etc.
Consider. agronómicas	Su floración es tardía así como la maduración de los frutos. Pese a una tendencia a la vecería marcada, en años de cosecha presenta elevadas producciones, siempre con un alto rendimiento graso. Puede considerarse la variedad más apropiada en condiciones de clima continental, sobre suelos pobres y secos. Su notable resistencia al desprendimiento condiciona por otra parte la recolección mecánica.

HOJIBLANCA



CARACTERÍSTICAS

Árbol	Floración y maduración tardía. Su recolección suele presentar dificultades en el desprendimiento por vibración. Resistente a sequía y suelos calizos. No destaca por resistencia a enfermedades. Resistencia media al frío, lo que le hace potencialmente interesante para zonas frías calizas del interior peninsular.
Denominación	Denominada así por el color de sus hojas, y también se la asigna con la toponimia de Lucentina.
Fruto	Hoja: Larga y lanceolada, de perfil plana. Fruto: Grande y ovoidal. Simétrico y con lenticelas características, abundantes y pequeñas. Hueso: Simétrico y redondeado. Con mucrón.
Valoración	Es la variedad con más importancia de las de doble aptitud, (fruto y aceite). Para aceituna de consumo en fresco es aderezada y procesada por el sistema de 'oxidación' que la transforma en una aceituna negra, bien valorada aunque inferior a la manzanilla. Su aceite por otra parte es bastante apreciado, aunque de baja estabilidad, lo que la hace muy interesante como base de distintos coupages con otras variedades como picual, picudo, etc.

REINA CLAUDIA VERDE

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso y de porte bastante abierto. tiene una entrada en producción algo lenta. Producción media a buena, irregular, muy altamente.
Floración	Auto compatible.
Maduración	Se recolecta en la segunda quincena de agosto.
Fruto	Es de calibre pequeño a medio, redondeado, ligeramente aplastado en los polos, a veces algo asimétricos sobre todo en la zona pistilar. La carne es verdosa o amarillo ámbar, de firmeza media, jugosa, dulce y de buena a excelente calidad gustativa.

GOLDEN JAPAN

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso y de porte abierto. Entrada en producción rápida, tiene producción muy buena.
Floración	Época media y muy abundante. Auto incompatible, buena variedad de ciruelo para polinizar.
Maduración	Se recolecta en la segunda decena de julio.
Fruto	calibre medio, esférico a acorazonado y simétrico. La piel es de color amarillo verdoso o amarilla en su completa madurez. Pulpa de color amarillo, no muy firme, jugosa y azucarada. Hueso adherente. Calidad gustativa media a buena según zona de cultivo.

REINA CLAUDIA FINA

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso y productivo.
Fruto	Medio redondeado de color verde, pulpa fina y jugosa de perfume y sabor característicos

SANTA ROSA

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Vigoroso y de porte erecto. Tiene una entrada en producción algo lenta y producción buena a muy buena y bastante regular.
Floración	Época semi precoz y muy abundante. Parcialmente autocompatible. Considerada buena polinizadora. Puede tener una floración muy extendida según condiciones climáticas.
Maduración	Se recolecta en la segunda quincena de Julio
Fruto	Calibre medio, redondeado a elíptico, aplanado en la zona pendular y algo asimétrico. La piel es semi fina, de color rojo brillante que se oscurece en plena madurez. Carne de color amarilla teñida de rojo, medianamente firme y jugosa, algo ácida junto a la piel y ligeramente amarga junto al hueso. Calidad gustativa media a buena.

REINA CLAUDIA TOLOSA

CARACTERÍSTICAS

Árbol	De vigor medio y porte semi erecto. Buena producción, aunque presenta tendencia a la vecería por lo que la poda es importante en esta variedad.
Floración	Semi precoz.
Polinización	Es auto fértil, no requiere de ser combinado con otra variedad para dar cosecha.
Fruto	Tamaño medio a grueso, de color verde amarillento con la carne ámbar. Madura varias semanas después que la verde.



STARKING

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Se trata de un árbol resistente, que se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas, pero prefiere un clima fresco y húmedo.
Floración	Tiene una época de floración media.
Maduración	Meses de otoño a partir de septiembre, según su maduración.
Fruto	Tamaño grande y forma cónica, su piel es de color rojo, de estriado uniforme y forma alargada con cinco lóbulos muy marcados alrededor del ojo. Posee un sabor ligeramente dulce.

VERDE DONCELLA

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Es un árbol de vigor medio a escaso, porte semi erguido, con vegetación muy tupida.
Floración	Floración medio tardía, auto fértil, pero le favorece la polinización cruzada con las variedades Starking y Golden Delicious
Maduración	La época de maduración de la variedad Verde doncella tiene lugar durante el mes de octubre, después que la variedad Fuji y Granny Smith.
Fruto	Es de calibre grueso si se aclarea, es de color blanco amarillento, chapa roja por el lado soleado, con carne verdosa, jugosa y perfumada de sabor dulce.

PERO DE CEHEGÍN

CARACTERÍSTICAS

E se trata de una de las variedades de manzanas de otoño, ya que necesita de los rigores de esta estación para alcanzar su perfecta maduración. Posee forma oblonga y su peso se encuentra alrededor de 180 gr.

Las tonalidades de color van desde el amarillo verdoso hasta el amarillo y su piel muestra un grosor especial que propicia una excelente conservación. Posee un sabor muy dulce que, unido al rico aroma que desprende, son las particularidades que definen la singularidad del Pero de Cehégín o de Alcuza.

GOLDEN DELICIOUS

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Es un árbol de vigor medio, entra rápidamente en producción y no sufre alternancia de cosechas, todos los años produce con regularidad.
Floración	Manzano auto fértil, es capaz de auto polinizarse, aunque puede mejorar la producción mediante el uso de un polinizador
Maduración	Su época de maduración es durante la primera quincena de septiembre.
Fruto	La manzana Golden Delicious tiene frutos de tamaño mediano a grande, de color verde amarillo o amarillo dorado. Es una manzana dulce, ligeramente ácida y aromática.

REINETA


CARACTERÍSTICAS

Árbol	Es un árbol de gran vigor, muy alterante en cosechas, defecto que se puede corregir con la poda. No destaca por su rápida entrada en producción.
Floración	Floración auto incompatible, mejor que sean dos variedades distintas las que lo polinicen, pueden ser la variedad Granny Smith, Golden delicious,... la floración del manzano Reineta tiene lugar 3-4 días después que la variedad Golden delicious.
Maduración	Su época de maduración es durante la primera quincena de septiembre.
Fruto	Forma achatada y es de color verde amarillento, no muy jugosa, de textura gruesa, con cierta acidez y muy apreciada por algunos consumidores.



PERAS

BLANQUILLA



ERCOLINI



PERETERO




viveros del sureste

CONFERENCIA



CASTELLS




ETRUSCA



OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES:

- MEMBRILLOS
- NISPEROS
- NOGAL
- CAKIS
- GRANADAS
- CEREZOS
- PISTACHOS
- HIGUERAS
- PARRAS



PORTAINJERTOS PARA ÁRBOLES DE HUESO

Variedades	Resistencia a la sequía	Resistencia a la tierra caliza	Resistencia a la humedad	Resistencia a los nemátodos	Otras características
Albaricoquero <i>Franco</i>	● ● ●	● ● ●	●	●	Es posible injertar una variedad de ciruelo
Almendro <i>Franco</i>	● ● ●	● ● ●	●	●	Se usa la selección de la variedad "Garrigues", lo que aumenta su homogeneidad
Melocotón <i>Franco</i>	● ●	●	●	●	No resiste más de un 8% de cal activa Muy usado en terrenos sueltos
Melocotón <i>Nemaguard</i>	● ●	●	●	● ● ●	Es una selección de melocotón por su resistencia a los nemátodos
Ciruelo <i>Mirabolán</i>	●	● ●	● ● ●	●	Es el ciruelo que mejor se adapta a todo tipo de terrenos
Ciruelo <i>San Julián</i>	●	●	● ● ●	●	De menor vigor que Mirabolán Se pueden injertar melocotoneros
Ciruelo <i>Mariana 26.24</i>	●	●	● ● ●	● ● ●	Adecuado en plantaciones de ciruelo con problemas de nemátodos y armillaria
Cerezo <i>Santa Lucía</i>	● ● ●	● ● ●	●	●	Usado en terrenos secos y calizos
Cerezo <i>Avium</i>	●	●	● ● ●	●	Adecuado en terrenos húmedos o que se encharcan
Híbrido <i>GF 677</i>	● ● ●	● ● ●	●	●	Muy usado por su precocidad y resistencia a la sequía
Híbrido <i>G x N</i>	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	Se destaca su gran resistencia a Nemátodos
Cadaman	● ●	● ●	● ●	● ● ●	Muy adecuado para cualquier tipo de suelo

Poco resistente ● Resistente ● ● Muy resistente ● ● ●



PSB Producción Vegetal

BUFFAT'S GENETICS

Albaricoque
Nectarina
Melocotón
Paraguayo
Platerina plana
Ciruela

ALBARICOQUE



[illegible]

19

NOVEDAD

THEO-cov (TJ67-104)

Denominación varietal THEO-cov CEE N° 2023/2228

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Colorado-cov +5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja con chapa, brillante
Calibre	AA-AAA
Gusto	Bueno, equilibrado



NOVEDAD

TC166-165-cov

Denominación varietal TC166-165-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Colorado +5 días
Época de floración	Colorado -5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja con chapa
Calibre	AA
Gusto	Bueno, dulce



NOVEDAD

DOMINO-cov (S36-29)

Denominación varietal DOMINO-cov CEE N° 2016/2614

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Flopria-cov -10 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Naranja con chapa roja, brillante
Calibre	AA
Gusto	Bueno



O'SOLEMIO-cov (TC104-25)

Denominación varietal O'SOLEMIO-cov CEE N° 2024/2531

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Flopria-cov +5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Naranja con chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, aromático



LIDO-cov (2147-25)

Denominación varietal LIDO-cov CEE Nº 2012/2222

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Flopria-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Fondo naranja con mucha chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, aromático



TITUS-cov (L32-9)

Denominación varietal TITUS-cov CEE Nº 2023/2222

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Flopria-cov +20 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Naranja con mucha chapa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce



ARISTO-cov (A07-1-207)

Denominación varietal ARISTO-cov CEE Nº 2016/2618

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Época Bergeron
Época de floración	Flopria-cov +15 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Naranja con mucha chapa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce



BALTAZAR-cov (TJ67-89)

Denominación varietal BALTAZAR-cov CEE Nº 2021/2713

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Bergeron +5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja con chapa, muy brillante
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



NELSON-cov (T56K-2)

Denominación varietal NELSON-cov CEE N° 2016/2619

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Milord-cov -5 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Muy alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Alargada, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy poco
Color	Fondo naranja intenso, chapa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



GASPAR-cov (LAR2174-73)

Denominación varietal GASPAR-cov CEE N° 2021/2714

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Época Farbaly
Época de floración	Flopria-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	Poco
Color	Naranja intenso con chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, jugoso, aromático



MADRIGAL-cov (LAR2124-229)

Denominación varietal MADRIGAL-cov CEE N° 2018/2667

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Farbaly-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Fondo naranja, chapa intensa
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



AGOSTINO-cov (LAR2164-65)

Denominación varietal AGOSTINO-cov CEE N° 2018/2668

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Farlis-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Naranja intenso con chapa
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, jugoso, aromático





ALBARICOQUE ROJO

ABRIL	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25										
			MARCELINO-cov	BA87-11																					
				FUEGO-cov	P52-106																				
					BOLERO-cov	HB278-104																			
						TC237-18-cov																			
											OTELO-cov	FAV149-10													

A AUTOFÉRTIL **S** TOLERANCIA A SHARKA



MARCELINO-cov (BA87-11)

Denominación varietal MARCELINO-cov CEE N° 2023/2226

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Floppria-cov -10 días
Época de floración	Época Floppria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, ovalada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro, lila
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce



FUEGO-cov (P52-106)

Denominación varietal FUEGO-cov CEE Nº 2012/2230

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Flopria-cov -5 días
Época de floración	Época Flopria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-recto
Autofertilidad	No, polinizadores: Flopria-cov, Cirano-cov, Cheyenne-cov

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce, aromático



BOLERO-cov (HB278-104)

Denominación varietal BOLERO-cov CEE Nº 2016/2617

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Flopria-cov +10 días
Época de floración	Flopria-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-recto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Ovalada, alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce, aromático



TC237-18-cov

Denominación varietal TC237-18-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Flopria-cov + 15 días
Época de floración	Flopria-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	AA
Gusto	Bueno, algo de acidez



OTELO-cov (FAV149-10)

Denominación varietal OTELO-cov CEE Nº 2023/2224


CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Época Milord-cov
Época de floración	Flopria-cov +15 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-recto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, muy aromático



ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25

A

CR7-53-cov

Denominación varietal CR7-53-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor -10 días
Época de floración	Época Pioneer
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto
Autofertilidad	AF en estudio. Polinizador; Rossa-mor-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy bueno, aromático, dulce



CHERRYPLUM

MONTECARLA-cov (CR20-1)

Denominación varietal MONTECARLA-cov CEE Nº 2023/2243

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor +5 días
Época de floración	Black Splendor +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: CR19-14-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Piel roja. Carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy dulce



ROSSAMOR-cov (BA86-34)

Denominación varietal ROSSAMOR-cov CEE Nº 2023/2241

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Black Splendor -5 días
Época de floración	Época Pioneer
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	Si

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy bueno, jugoso



CHERRYPLUM

NOVEDAD

CR19-14-cov

Denominación varietal CR19-14-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor +15 días
Época de floración	Black Splendor +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: Montecarla-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja. Carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy dulce



NOVEDAD

CR18-19-cov

Denominación varietal CR18-19-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Black Splendor +15 días
Época de floración	Black Splendor - 10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: BA91-16-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne amarilla
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy bueno, aromático, dulce



NOVEDAD

BA91-16-cov

Denominación varietal BA91-16-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Fortune -15 días
Época de floración	Black Splendor -10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto
Autofertilidad	AF en estudio. Polinizable con CR18-19-cov para aumentar cuaje

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy buena
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	55-60mm
Gusto	Muy bueno, aromático, dulce



CHERRYPLUM

NOVEDAD

ORELYS-cov (STRATI-4)

Denominación varietal ORELYS-cov CEE Nº 2024/2532

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Pallatina-cov -5 días
Época de floración	Pallatina-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Media
Árbol	Vigor medio
Autofertilidad	No

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Piel roja clara, carne roja
Calibre	40-45mm
Gusto	Muy dulce, jugoso



PALLATINA-cov (K321-75)

Denominación varietal PALLATINA-cov CEE Nº 2020/2645

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Fortune -5 días
Época de floración	Época Black Splendor
Floribondidad	Muy buena
Producción	Muy buena
Árbol	Vigoroso, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: CR43-9-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



CR43-9-cov

Denominación varietal CR43-9-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Fortune +10 días
Época de floración	Época Black Splendor
Floribondidad	Alta
Producción	Muy buena
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	No, polinizador: Pallatina-cov

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel roja, carne roja
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy dulce, muy aromático



AZULIS-cov (CR45-4)

Denominación varietal AZULIS-cov CEE Nº 2022/2411

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Angeleno -15 días
Época de floración	Black Splendor +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-recto
Autofertilidad	No, polinizadores: Pallatina-cov, CR43-9-cov

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme. Óptimo aguante en el árbol
Cracking	No
Color	Piel negra, carne amarilla
Calibre	50-55mm
Gusto	Muy dulce, muy aromático



CHERRYPLUM

NOVEDAD

CA584-30-cov

Denominación varietal CA584-30-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Angeleno
Época de floración	Angeleno +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto
Autofertilidad	En estudio

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Piel negra, carne roja
Calibre	45-50mm
Gusto	Muy dulce



CHERRYPLUM

NOVEDAD

BA345-5-cov

Denominación varietal BA345-5-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Angeleno +10 días
Época de floración	Angeleno +20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto
Autofertilidad	No, polinizador: CA584-30-cov

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Piel verde/amarilla, carne amarilla
Calibre	55-60mm
Gusto	Muy dulce y crocante





CALENDARIO MELOCOTÓN AMARILLO

ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	(SUB)	KITTY-cov BN600-1																								
			POMPADOUR-cov K202-6																							
				NICOSY-cov 5560-3																						
					LOLA-cov 292-8																					
				(SUB)	VERACRUZ-cov BN366-1																					
						CARLA-cov B428-5																				
				(SUB)	BN86-2-cov																					
							(SUB)	PAMPANA-cov K313-26																		
								(SUB)	X	ARIZONA-cov 5683-7																
										(SUB)	SOLEDORA-cov 5610-1															
											(SUB)	CHARLOTTE-cov BN928-7														
																	Sweet Dream-cov Testigo									
													(SUB)	X	THALIS-cov BUT12-10-2											
															(SUB)	TAONUÍ-cov BN993-5										
																(SUB)	X	ODYSEE-cov BN1106-11								
																		Sweet Henry-cov Testigo								
																		(SUB)	BN1112-6-cov							

PERNILLE-cov

Denominación varietal PERNILLE-cov CEE N°2025/2030

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Astoria-cov
Época de floración	Época Lola-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Fuerte, abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	mediana
Cracking	No
Color	Rojo carne amarilla
Calibre	A
Gusto	Equilibrado, de acuerdo a la fecha



KITTY-cov (BN600-1)

Denominación varietal KITTY-cov CEE N° 2023/2266

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Astoria-cov +5 días
Época de floración	Astoria-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Media
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	B-A
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido



POMPADOUR-cov (K202-6)

Denominación varietal POMPADOUR-cov CEE N° 2016/2620

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Astoria-cov +10 días
Época de floración	Época Astoria-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Bueno, equilibrado



NICOSY-cov (5560-3)

Denominación varietal NICOSY-cov CEE N° 2024/2256

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Astoria-cov +15 días
Época de floración	Época Lola-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, equilibrado



VERACRUZ-cov (BN366-1)

Denominación varietal VERACRUZ-cov CEE Nº 2023/2268

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Astoria-cov +25 días
Época de floración	Época Lola-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Dulce, bueno y subácido



PAMPANA-cov (K313-26)

Denominación varietal PAMPANA-cov CEE Nº 2014/2518

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Carla-cov +15 días
Época de floración	Carla-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



MARIACHI-COV

Denominación varietal MARIACHI-cov CEE Nº 2025/2044

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Carla-cov
Época de floración	Carla-cov -10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Media
Árbol	Medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo carne amarilla
Calibre	A/AA
Gusto	Dulce con aroma, subácido



CHARLOTTE-cov (BN928-7)


Denominación varietal CHARLOTTE-cov CEE Nº 2024/2542

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Sweet Dream-cov -10 días
Época de floración	Carla-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



TAONUI-cov (BN993-5)

Denominación varietal TAONUI-cov CEE Nº2025/2046

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Sweet Dream-cov +15 días
Época de floración	Época Sweet Dream-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	AA
Gusto	Bueno, subácido



ODYSEE-cov (BN1106-11)

Denominación varietal ODYSEE-cov CEE Nº 2022/2404

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Sweet Henry-cov -5 días
Época de floración	Época Sweet Henry-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Media
Árbol	Vigor elevado, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	AA-A
Gusto	Bueno, muy dulce y subácido



BN1112-6-cov

Denominación varietal BN1112-6-cov


CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Sweet Henry-cov +5 días
Época de floración	Época Sweet Henry-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido





CALENDARIO MELOCOTÓN BLANCO

ABRIL	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20 25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	MADRAS-cov BN313-15																								
	AMANDINA-cov T191-1																								
		SUB MARMARA-cov 5746-17																							
			X PAMELA-cov B407-2																						
				Patty® Testigo																					
				SUB MAREVA-cov K313-24																					
					SUB BN610-3-cov																				
						SUB ALABAMA-cov 5888-25																			
							SUB X MELISSA-cov HA693-1																		
								SUB X IBIZA-cov 4094-16																	
									SUB BP172-23-cov																
										SUB FABULISA-cov BN927-8															
											SUB BN927-4-cov														

NOVEDAD

MADRAS-cov (BN313-15)

Denominación varietal MADRAS-cov CEE Nº 2024/2255

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Amandina-cov -5 días
Época de floración	Amandina-cov -5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	A-B
Gusto	Bueno, equilibrado



PEPPA-cov

Denominación varietal PEPPA-cov CEE Nº2025/2027

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Amandina-cov +10 días
Época de floración	Amandina-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Media
Árbol	Fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo claro, carne amarilla
Calibre	A
Gusto	Muy dulce, con aroma a paraguay



AMANDINA-cov (T191-1)

Denominación varietal AMANDINA-cov CEE Nº 2013/3048

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Media: 5 de mayo
Época de floración	Media: 20 de enero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, equilibrado y aromático



MARMARA-cov (5746-17)

Denominación varietal MARMARA-cov CEE Nº 2019/2722

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Pamela-cov-10 días
Época de floración	Amandina-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



PAMELA-cov (B407-2)

Denominación varietal PAMELA-cov CEE N° 2012/2212

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Media: 25 de mayo
Época de floración	Media: 25 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, aromático



NOVEDAD

BN610-3-cov

Denominación varietal BN610-3-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Pamela-cov +20 días
Época de floración	Pamela-cov -5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



MAREVA-cov (K313-24)

Denominación varietal MAREVA-cov CEE N° 2015/2396

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Pamela-cov +10 días
Época de floración	Pamela-cov -5 días
Floribondidad	Muy buena
Producción	Muy buena
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



ALABAMA-cov (5888-25)

Denominación varietal ALABAMA-cov CEE N° 2017/2630

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Pamela-cov +30 días
Época de floración	Mareva-cov +12 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



MELISSA-cov (HA693-1)

Denominación varietal MELISSA-cov CEE N° 2016/2625

CARACTERÍSTICAS

SUB X

Época de maduración	Ibiza-cov -5 días
Época de floración	Época Pamela-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



FABULISA-cov (BN927-8)

Denominación varietal FABULISA-cov CEE N° 2024/2541

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Ibiza-cov +15 días
Época de floración	Época Pamela-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



BN927-4-cov

Denominación varietal BN927-4-cov


CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Ibiza-cov +20 días
Época de floración	Época Ibiza-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce





CALENDARIO MELOCOTÓN PAVÍA

ABRIL	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20 25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
						ZN175-5-cov																			
						PALOMBAGGIA-cov					HA167-2														
						BORNEO-cov					HA163-56														
						TN411-8-cov																			
											BN774-8-cov														
												TN472-5-cov													
												MYMOSA-cov					TN473-9								
													BN889-5-cov												

PALOMBAGGIA-cov (HA167-2)

Denominación varietal PALOMBAGGIA-cov CEE N° 2017/2632

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Romea -10 días
Época de floración	Romea -20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo 100 %
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, equilibrado



NOVEDAD

BN774-8-cov

Denominación varietal BN774-8-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Yellowstone
Época de floración	Temprana
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Media
Cracking	No
Color	Amarillo 100%
Calibre	AAA-AA
Gusto	Equilibrado



TN411-8-cov

Denominación varietal TN411-8-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Romea +5 días
Época de floración	Época Big Top®
Floribondidad	Media
Producción	Elevada
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo con leve blush
Calibre	AA
Gusto	Dulce, poco aroma



MYMOSA-cov (TN473-9)

Denominación varietal MYMOSA-cov CEE N° 2024/2540

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Mountain Gold
Época de floración	Época Mountain Gold
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Gusto tradicional, subácido



PARAGUAYO AMARILLO



ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	(SUB)	ESPIRAL-cov		BN45-2																						
		(SUB)	KIWANI-cov		5607-6																					
			(SUB)	DIVADONA-cov		5544-54																				
				(SUB)	AC556-2-cov																					
					(SUB)	OSIRIS-cov		HA555-3																		
												(SUB)	5911-10-cov													



SUB



(SUB) SUBÁCIDO

(SUB)



DIVADONA-cov (5544-54)

Denominación varietal DIVADONA-cov CEE N° 2014/2514

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Media: 10 de mayo
Época de floración	Media: 5 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-B
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



AC556-2-cov

Denominación varietal AC556-2-cov

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Samantha-cov -5 días
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido



OSIRIS-cov (HA555-3)

Denominación varietal OSIRIS-cov CEE N° 2014/2515

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Samantha-cov +5 días
Época de floración	Samantha-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



5911-10-cov

Denominación varietal 5911-10-cov

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Época Platibelle-cov +5 días
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce con aroma, subácido





CALENDARIO

	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ALBARICOQUE						
ALBARICOQUE						
ALBARICOQUE ROJO						
AUTOFÉRTIL						
TOLERANCIA A SHARKA						
CIRUELA						
CIRUELA						
AUTOFÉRTIL						
MELOCOTÓN						
MELOCOTÓN AMARILLO						
MELOCOTÓN BLANCO						
MELOCOTÓN PAVÍA						
SUBÁCIDO						
TOLERANCIA A XANTHOMONAS						
PARAGUAYO Y NECTARINA PLANA						
PARAGUAYO AMARILLO						
PARAGUAYO BLANCO						
NECTARINA PLANA AMARILLA						
NECTARINA PLANA BLANCA						
SUBÁCIDO						
TOLERANCIA A XANTHOMONAS						

- NECTARINA AMARILLA
- NECTARINA BLANCA
- NECTARINA SANGUINA
- NECTAGOLD

X TOLERANCIA A XANTHOMAS

DAYTONA-cov TN379-10
TN379-16-cov
BN1004-1-cov



45

PARAGUAYO BLANCO



X TOLERANCIA A XANTHOMONAS **SUB** SUBÁCIDO



ZODIAC-cov (5607-5)

Denominación varietal ZODIAC-cov CEE Nº 2018/2720

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Samantha-cov -20 días
Época de floración	Samantha-cov -20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-B
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



SAMANTHA-cov (HA555-45)

Denominación varietal SAMANTHA-cov CEE Nº 2012/2218

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Media: 30 de mayo
Época de floración	Media: 25 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, subácido



BOSSANOVA-cov

Denominación varietal BOSSANOVA-cov CEE Nº 2023/2269

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Samantha-cov
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Achatada
Firmeza	Mediana
Cracking	No
Color	Rojo claro, carne blanca
Calibre	A/B
Gusto	Muy bueno, subácido, jugoso



CONTESSA-cov (HA544-18)

Denominación varietal CONTESSA-cov CEE Nº 2016/2627

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Samantha-cov +15 días
Época de floración	Samantha-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, subácido



BABYLONE-cov (AC552-2)

Denominación varietal BABYLONE-cov CEE Nº 2018/2721

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Samantha-cov +15 días
Época de floración	Samantha-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



KALDONIA-cov (BU1-190)

Denominación varietal KALDONIA-cov CEE Nº 2024/2544

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Platibelle-cov -5 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo claro
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



MARQUESA-cov (AC601-9)

Denominación varietal MARQUESA-cov CEE Nº 2021/2722

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Samantha-cov +20 días
Época de floración	Samantha-cov -5 días
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Muy buena
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce, subácido



CARAMBA-cov (B426-5)

Denominación varietal CARAMBA-cov CEE Nº 2013/3057

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Época Platibelle-cov
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy débil
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



KARAÏBE-cov (BN1-360)

Denominación varietal KARAÏBE-cov CEE N° 2024/2545

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Platibelle-cov +5 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	AA
Gusto	Bueno, dulce y subácido



CYCLADE-cov (BP171-4)

Denominación varietal CYCLADE-cov CEE N° 2021/2725

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Platibelle-cov +10 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce, subácido



FILOE-cov (5927-3)

Denominación varietal FILOE-cov CEE N° 2016/2629

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Sweet Cap® +5 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



KALISTA-cov (BP171-33)

Denominación varietal KALISTA-cov CEE N° 2022/2408

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Sweet Cap® +15 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo claro
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce y subácido





NECTARINA AMARILLA



ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
		PATAGONIA-cov T64-36																								
(SUB)		NEROLIS-cov TN272-43																								
	(SUB)	COPACABANA-cov 5709-11																								
		GARCIMA-cov N2-88																								
	(SUB)	IPANEMA-cov 5709-24																								
	(SUB)	TRINITY-cov CN120-10																								
	(SUB) X	OMEGA-cov 5692-58																								
	(SUB)	CARACAS-cov 5710-48																								
		(SUB) ORIGAMI-cov TN344-52																								
		(SUB) X ATANAIS-cov 5661-26																								
		Big Top® Testigo																								
		(SUB) X MATISS-cov 5661-56																								
		(SUB) CLARISS-cov 4052-22																								
		(SUB) SUCULENTE-cov 5785-3																								
		(SUB) X NEFERTITI-cov BN950-6																								
		5549-96-cov																								
		(SUB) TAHITI-cov BN931-16																								
		(SUB) KINOLEA-cov 4052-15																								
		(SUB) X HAWAI-cov BN1118-28																								
		(SUB) X TENERIF-cov BN1097-20																								
		WesternRed-cov Testigo																								
		ESMERALDA-cov 4055-10																								
		(SUB) BN1066-1-cov																								
		(SUB) BN1043-1-cov																								

COPACABANA-cov (5709-11)

Denominación varietal COPACABANA-cov CEE Nº 2017/2609

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Flariba-cov +5 días
Época de floración	Flariba-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso 100 %
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido



IPANEMA-cov (5709-24)

Denominación varietal IPANEMA-cov CEE Nº 2017/2610

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Garofa-cov -10 días
Época de floración	Flariba-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100 %
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido



TRINITY-cov (CN120-10)

Denominación varietal TRINITY-cov CEE Nº 2023/2256

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Garofa-cov -5 días
Época de floración	Flariba-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Muy buena
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	A
Gusto	Muy dulce y subácido



ATANAIS-cov (5661-26)

Denominación varietal ATANAIS-cov CEE Nº 2016/2626

CARACTERÍSTICAS (SUB) X

Época de maduración	Época Big top®
Época de floración	Big Top® -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy buena
Cracking	No
Color	Rojo intenso brillante
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, subácido



MATISS-cov(5661-56)

Denominación varietal MATISS-cov CEE Nº 2020/2677

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Luciana-cov -5 días
Época de floración	Época Big Top®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-recto

FRUTA

Forma	Redonda, sin punta
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



CLARISS-cov(4052-22)

Denominación varietal CLARISS-cov CEE Nº 2014/2513

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Luciana-cov +5 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Buena
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100 %
Calibre	AA-A
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



NOVEDAD

SUCULENTE MARI-cov(5785-3)

Denominación varietal SUCULENTE MARI-cov CEE Nº 2020/2678

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Luciana-cov +15 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido, aromático



NEFERTITI-cov(BN950-6)

Denominación varietal NERFERTITI-cov CEE Nº 2023/2257

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Kinolea-cov -15 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



5549-96-cov

Denominación varietal 5549-96-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Kinolea-cov -15 días
Época de floración	Luciana-cov -5 días
Floribondidad	Elevada
Producción	Elevada
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Negro 100%
Calibre	A
Gusto	Dulce, subácido



KINOLEA-cov (4052-15)

Denominación varietal KINOLEA-cov CEE N° 2014/2512

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Media: 5 de agosto
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo claro 50%
Calibre	AA-AAA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



TAHITI-cov (BN931-16)

Denominación varietal TAHITI-cov CEE N° 2023/2258

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Kinolea-cov -5 días
Época de floración	Luciana-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100%
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



HAWAÏ-cov (BN1118-28)

Denominación varietal HAWAÏ-cov CEE N° 2022/2406

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Kinolea-cov +10 días
Época de floración	Luciana-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor bajo, semi-recto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo 100 %
Calibre	AA-A
Gusto	Buenísimo, muy dulce y subácido



NOVEDAD

TENERIF-cov (BN1097-20)

Denominación varietal TENERIF-cov CEE N°2025/2045

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Western Red-cov -5 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



NOVEDAD

BN1043-1-cov

Denominación varietal BN1043-1-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Western Red-cov +20 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, achatada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo anaranjado, brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



NOVEDAD

BN1066-1-cov

Denominación varietal BN1066-1-cov


CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Western Red-cov +15 días
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo anaranjado, brillante
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



NECTARINA BLANCA



CALENDARIO NECTARINA BLANCA

ABRIL		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
(SUB) DIAMENTINA-cov 5235-2		FLAVANA-cov N2-24																								
		(SUB) ALTAMIRA-cov 5710-50																								
		(SUB) X BOREAL-cov T333-31																								
							(SUB) X AMAPOLA-cov 5829-22																			
							(SUB) X GARCICA-cov N48-21																			
							(SUB) BN861-26-cov																			
												(SUB) CALICOBA-cov 5635-31														
												(SUB) X VAHINE-cov 5904-21														
												(SUB) TIFANY-cov 4050-1														
												(SUB) ALEGORIA-cov BN1118-11														
												(SUB) BN1118-68-cov														
												Zephyr® Testigo														
												(SUB) X CHUBBY-cov BN1118-24														
												Tourmaline® Testigo														
												(SUB) CN600-2-cov														
												BN944-4 (SUB) SIDONIA-cov														

(X) TOLERANCIA A XANTHOMONAS (SUB) SUBÁCIDO

DIAMENTINA-cov (5235-2)

Denominación varietal DIAMENTINA-cov CEE Nº 2017/2623

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración Flavela-cov -5 días
Época de floración Época Flavela-cov
Floribondidad Alta
Producción Alta
Árbol Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma Redonda
Firmeza Firme
Cracking No
Color Rojo brillante
Calibre B-A
Gusto Bueno, aromático y subácido



FLAVANA-cov (N2-24)

Denominación varietal FLAVANA-cov CEE Nº 2004/2497

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración Flavela-cov +5 días
Época de floración Época Flavela-cov
Floribondidad Alta
Producción Alta
Árbol Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma Redonda, sin punta
Firmeza Muy firme
Cracking No
Color Rojo oscuro con brillo
Calibre A
Gusto Bueno, equilibrado



PUNTACANA-cov

Denominación varietal PUNTACANA-cov CEE Nº 2023/2255

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Flavela-cov +10 días
Época de floración	Flavela-cov +5 días
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Fuerte, abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo intenso, carne blanca
Calibre	A
Gusto	Bueno, subácido y muy aromático



BOREAL-cov (T333-31)

Denominación varietal BOREAL-cov CEE Nº 2014/2530

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Media: 20 de mayo
Época de floración	Media: 10 de febrero
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, aromático y subácido



ALTAMIRA-cov (5710-50)

Denominación varietal ALTAMIRA-cov CEE Nº 2018/2723

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Boreal-cov -5 días
Época de floración	Boreal-cov -10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda, alargada
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



AMAPOLA-cov (5829-22)

Denominación varietal AMAPOLA-cov CEE Nº 2019/2724

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Garcica-cov -10 días
Época de floración	Época Boreal-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda perfecta
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo con brillo
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y aromático



CALICOPA-cov (5635-31)

Denominación varietal CALICOPA-cov CEE Nº 2021/2717

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Garcica-cov +20 días
Época de floración	Boreal-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante con pecas
Calibre	AA
Gusto	Dulce, aromático y subácido



VAHINE-cov (5904-21)

Denominación varietal VAHINE-cov CEE Nº 2020/2668

CARACTERÍSTICAS SUB X

Época de maduración	Tifany-cov -5 días
Época de floración	Época Tifany-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme, aguanta en el árbol
Cracking	No
Color	Rojo intenso, brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



TIFANY-cov (4050-1)

Denominación varietal TIFANY-cov CEE Nº 2010/2743

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Media: 25 de julio
Época de floración	Media: 5 de marzo
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	AA
Gusto	Dulce, aromático y subácido



ALEGORIA-cov (BN118-11)

Denominación varietal ALEGORIA-cov CEE Nº 2024/2533

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Tifany-cov +10 días
Época de floración	Tifany-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Standard, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Bueno, subácido



NOVEDAD

BN1118-68-cov

Denominación varietal BN1118-68-cov

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración Tiffany-cov +15 días
Época de floración Tiffany-cov +10 días
Floribondidad Alta
Producción Alta
Árbol Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma Redonda achatada
Firmeza Muy firme
Cracking No
Color Rojo oscuro
Calibre AA
Gusto Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

CN600-2-cov

Denominación varietal CN600-2-cov

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración Época Nectarlam
Época de floración Época Kinolea-cov
Floribondidad Elevada
Producción Alta
Árbol Muy vigoroso

FRUTA

Forma Redonda achatada
Firmeza Firme
Cracking No
Color Rojo 100%
Calibre A-AA
Gusto Dulce, aromático, subácido



NOVEDAD

CHUBBY-cov (BN1118-24)

Denominación varietal CHUBBY-cov CEE N° 2024/2534

CARACTERÍSTICAS

SUB

X

Época de maduración Época Tourmaline®
Época de floración Época Tourmaline®
Floribondidad Alta
Producción Alta
Árbol Standard, semi-abierto

FRUTA

Forma Redonda
Firmeza Muy firme
Cracking No
Color Rojo brillante 100%
Calibre AA
Gusto Bueno, subácido



SIDONIA-cov (BN944-4)

Denominación varietal SIDONIA-cov CEE N° 2021/2720

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración Tourmaline® +25 días
Época de floración Tiffany-cov +5 días
Floribondidad Alta
Producción Alta
Árbol Vigor medio, semi-abierto

FRUTA

Forma Redonda
Firmeza Muy buena, aguanta en el árbol
Cracking No
Color Rojo oscuro completo
Calibre AA
Gusto Muy bueno, subácido y aromático





CALENDARIO NECTAGOLD

ABRIL	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
20 25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
						DAYTONA-cov	TN379-10																		
						TN379-16-cov																			
						BN1004-1-cov																			
											BN1002-26-cov														
											BN1003-5-cov														
											GOLDYGA-cov	BN1002-25													
											5889-120-cov														
															BN1002-7-cov										

DAYTONA-cov (TN379-10)

Denominación varietal DAYTONA-cov CEE N° 2017/2633

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Garofa-cov
Época de floración	Época Garofa-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	B
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



NOVEDAD

BN1004-1-cov

Denominación varietal BN1004-1-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Garofa-cov +10 días
Época de floración	Garofa-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo sin chapa roja
Calibre	B-A
Gusto	Equilibrado, dulce y aromático



TN379-6-cov

Denominación varietal TN379-6-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Daytona-cov +5 días
Época de floración	Garofa-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	B
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



NOVEDAD

BN1002-26-cov

Denominación varietal BN1002-26-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Luciana-cov -5 días
Época de floración	Época Garofa-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigoroso, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con un poco chapa roja
Calibre	B-A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



BN1003-5-cov

Denominación varietal BN1003-5-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Luciana-cov -5 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, muy dulce y muy aromático



NOVEDAD

5889-246-cov

Denominación varietal 5889-246-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Luciana-cov +5 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Muy firme
Cracking	Poco
Color	Amarillo
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



GOLDYGA-cov(BN1002-25)

Denominación varietal GOLDYGA-cov CEE N° 2024/2536

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Luciana-cov
Época de floración	Garofa-cov +5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



NOVEDAD

BN1002-7-cov

Denominación varietal BN1002-7-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Kinolea-cov -10 días
Época de floración	Época Luciana-cov
Floribondidad	Media
Producción	Media
Árbol	Medio alto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Amarillo con chapa roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado, dulce y muy aromático



ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25
			CN295-1-cov		
				BN1117-17-cov	
				BN1117-11-cov	
				DIABLOTINA-cov DOR9-1	

NOVEDAD

CN295-1-cov

Denominación varietal CN295-1-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Diablotina-cov -40 días
Época de floración	Época Diablotina-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Alargada
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



NOVEDAD

BN1117-11-cov

Denominación varietal BN1117-11-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Diablotina-cov -5 días
Época de floración	Época Diablotina-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



NOVEDAD

BN1117-17-cov

Denominación varietal BN1117-17-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Diablotina-cov -20 días
Época de floración	Época Diablotina-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



DIABLOTINA-cov (DOR9-1)

Denominación varietal DIABLOTINA-cov CEE Nº 2017/2640

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Época Kinolea-cov
Época de floración	Luciana-cov +10 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA


Forma	Redonda
Firmeza	Firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro brillante, carne roja
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, equilibrado y aromático



NECTARINA PLANA



CALENDARIO NECTARINA PLANA



NECTARINA PLANA AMARILLA

NECTARINA PLANA BLANCA

X TOLERANCIA A XANTHOMONAS

(SUB) SUBÁCIDO

LUISELLA-cov (5544-58)

Denominación varietal LUISELLA-cov CEE Nº 2020/2679

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

Época de maduración Samantha-cov -5 días

Época de floración Samantha-cov -20 días

Floribondidad Alta

Producción Alta

Árbol Vigor normal, semi-erecto

FRUTA

Forma Plana

Firmeza Firme

Cracking Muy débil

Color Rojo oscuro

Calibre B-A

Gusto Muy bueno, dulce y subácido



USHUAYA-cov (CN158-11)

Denominación varietal USHUAYA-cov CEE Nº 2023/2262

CARACTERÍSTICAS

(SUB)

Época de maduración Samantha-cov +5 días

Época de floración Samantha-cov -20 días

Floribondidad Alta

Producción Alta

Árbol Vigor normal, semi abierto

FRUTA

Forma Plana


Firmeza Muy firme

Cracking Muy débil

Color Rojo intenso 100%

Calibre B-A

Gusto Muy bueno, subácido y aromático



CARNE AMARILLA

NOVEDAD

HONOLULU-cov (CN158-32)

Denominación varietal HONOLULU-cov CEE N° 2024/2258

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Samantha-cov +5 días
Época de floración	Samantha-cov -20 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



CARNE AMARILLA

ANAKIN-cov (AC459-25)

Denominación varietal ANAKIN-cov CEE N° 2023/2263

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Platibelle-cov -10 días
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	A-AA
Gusto	Muy dulce, aromático y subácido



DOOLY-cov (CN128-16)

Denominación varietal DOOLY-cov CEE N° 2023/2260

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Samantha-cov +15 días
Época de floración	Samantha-cov -5 días
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



BACHATA-cov (CN64-1)

Denominación varietal BACHATA-cov CEE N° 2023/2261

CARACTERÍSTICAS SUB

Época de maduración	Platibelle-cov -5 días
Época de floración	Samantha-cov +5 días
Floribondidad	Baja
Producción	Media
Árbol	Vigor muy fuerte

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

SERAFINA (EP001-9-cov)

Denominación varietal EP001-9-cov CEE N°2025/2018

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Época Platibelle-cov
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

SOLSTYS-cov (EP13-25)

Denominación varietal SOLSTYS-cov CEE N°2025/2019

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Sweet Cap® -15 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, subácido y aromático



TINTOSA-cov (CN239-49)

Denominación varietal TINTOSA-cov CEE N° 2020/2680

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Platibelle-cov +10 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	Muy débil
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

EP13-9-cov

Denominación varietal EP13-9-cov

CARACTERÍSTICAS (SUB)

Época de maduración	Sweet Cap® -5 días
Época de floración	Época Platibelle-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-recto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce, subácido



DIOSA-cov (BP171-22)

Denominación varietal DIOSA-cov CEE N° 2020/2698

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Sweet Cap® -5 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



CARNE AMARILLA

YSATIS-cov (BP171-5)

Denominación varietal YSATIS-cov CEE N° 2023/2264

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Época Sweet Cap®
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Muy elevada
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante
Calibre	AA
Gusto	Muy dulce, subácido



ZENDAYA-cov (DN458-3)

Denominación varietal ZENDAYA-cov CEE N° 2024/2539

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Época Sweet Cap®
Época de floración	Época Samantha-cov
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo brillante 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



NOVEDAD

EP14-19-cov

Denominación varietal EP14-19-cov

CARACTERÍSTICAS



Época de maduración	Canoppe-cov -15 días
Época de floración	Época Canoppe-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-abierto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	Poco
Color	Rojo intenso 100%
Calibre	A-AA
Gusto	Dulce, subácido y aromático



EP001-3-cov

Denominación varietal EP001-3-cov

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Canoppe-cov -5 días
Época de floración	Época Canoppe-cov
Floribondidad	Media
Producción	Alta
Árbol	Vigor normal, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Firme
Cracking	Muy poco
Color	Rojo oscuro
Calibre	A
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



CANOPPE-cov (CN591-2)

Denominación varietal CANOPPE-cov CEE N° 2020/2692

CARACTERÍSTICAS

SUB

Época de maduración	Sweet Cap® +20 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Plana
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido



COOKIE-cov (CN592-12)

Denominación varietal COOKIE-cov CEE N° 2020/2697

CARACTERÍSTICAS

Época de maduración	Sweet Cap® +45 días
Época de floración	Época Sweet Cap®
Floribondidad	Alta
Producción	Alta
Árbol	Vigor fuerte, semi-erecto

FRUTA

Forma	Redonda, chata
Firmeza	Muy firme
Cracking	No
Color	Rojo oscuro
Calibre	A-AA
Gusto	Muy bueno, dulce y subácido





Investigación y difusión
de nuevas variedades de fruta
Albaricoque - Cereza - Ciruela

2026




cOT
international

PRONTO COT Dcov



Variedad de maduración muy precoz, antes de MAYACOT, y con bajas necesidades de frío. AUTOFÉRTIL, la variedad tiene un buen potencial agronómico. Su fruto es atractivo. Su calidad gustativa es muy buena, con jugosidad y un aroma agradable.

FLORACION

Época: Muy precoz
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{nda} hoja
Necesidades de frío: Zona 1 – muy bajas
Resistencia a la Sharka: No

FRUTO

Maduración: Muy precoz - semana 19
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 6-7
Calibre: 2A - 45-50 mm
Forma: Oval
Color de fondo: Naranja claro
Sobreimpresión: Roja sobre 30-50% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 14.5° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Media a buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

ES 19-02

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2023/0939 el 28/04/2023.

NEW

ALPHA COT



Variedad muy precoz y AUTOFÉRTIL. Seleccionada en Murcia, tiene pocas necesidades de frío. Presenta un excelente nivel agronómico y una calidad de fruto excepcional para la época.

FLORACION

Época: Muy precoz
Floración: Buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{nda} o 3^{era} hoja
Necesidades de frío: Zona 2 – bajas
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA


FRUTO

Maduración: Muy precoz - semana 20
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 6-7
Calibre: 2A/3A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 30-50% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 14.2° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

ES 21-34

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N° 2026/0448 el 27/02/2026.

LUNA COT Dcov



Variedad muy precoz, como MAYACOT, con bajas necesidades de frío. AUTOFÉRTIL, la variedad tiene un buen potencial agronómico. Su fruto es atractivo. Su calidad gustativa es excelente.

FLORACION	ARBOL
Época: Muy precoz	Porte: Semi abierto
Floración: Buena a muy buena	Vigor: Bueno
Fertilidad: AUTOFÉRTIL	Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2 ^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 1-2 – muy bajas y bajas
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA

FRUTO
Maduración: Muy precoz - semana 20
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7-8
Calibre: 2A – 45/50 mm
Forma: Semi redonda
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 30-50% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 14° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

ES 19-12
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2024/0996 el 29/04/2024.

SMART COT Cov



Variedad precoz (época WONDER COT), AUTOFÉRTIL. El fruto es muy atractivo, firme y con una epidermis resistente. Su sabor dulce y jugoso es una gran ventaja en este nicho de madurez.

FLORACION	ARBOL
Época: Precoz	Porte: Semi abierto
Floración: Buena	Vigor: Muy fuerte
Fertilidad: AUTOFÉRTIL	Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
Productividad: Buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2 ^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: RESISTENTE

FRUTO
Maduración: Precoz - semana 21
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 6-7
Calibre: 3A/ 2A - 45-55 mm
Forma: Elíptica
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 20% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 14° Brix; textura fina y jugosa
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2013-15
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 70346 el 01/09/2025.



CHOUCOT Dcov



Variedad precoz **AUTOFÉRTIL** con gran potencial agronómico. Fruto muy bonito, atractivo y brillante. Su calidad gustativa es excelente, con una jugosidad y un aroma agradables.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: **AUTOFÉRTIL**

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 2-3 – bajas a medias
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 21-22
Fase de cosecha: Código color CTIFL: L 7-8
Calibre: 2A/3A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 30-60% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 15.4° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Buena - 3 semanas

ES 19-43

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2023/1774 el 24/08/2023.

FIESTA COT Cov



Variedad de la misma época de **MAGIC COT**, pero **AUTOFÉRTIL**, con una producción más regular, rústica y con frutos más resistentes a las inclemencias meteorológicas. Su sabor y aspecto fueron muy apreciados por todos los visitantes.

FLORACION

Época: Media
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: **AUTOFÉRTIL**

ARBOL

Portamento: Semi eretto
Porte: Semi Abierto
Vigor: Fuerte
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: No

FRUTO


Maduración: Precoz - semana 22
Fase de cosecha: Código color CTIFL: L 7-8
Calibre: 3A/ 2A - 45-55 mm
Forma: Elíptica
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 20-40% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 14.5° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2011-16

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU66220 el 08/04/2024.

NEW

ES 21-186 Dcov



Variedad semi precoz AUTOFÉRTIL, de tipo ROJO. Seleccionada en Murcia, tiene pocas necesidades de frío, una gran productividad y un fruto rojo brillante muy atractivo y delicioso.


FLORACION	ARBOL
Época: Media	Porte: Semi abierto
Floración: Buena a muy buena	Vigor: Muy Fuerte
Fertilidad: AUTOFÉRTIL	Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 2 – bajas
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA

FRUTO
Maduración: Semi precoz - semana 23
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7-8
Calibre: 2A - 45-50 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 90% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 16,4° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

ES 21-186
OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N° 2025/2567 el 28/11/2025.

DREAM COT Dcov



Variedad semiprecoz AUTOFÉRTIL. Fruto muy bonito, liso y brillante. Su calidad gustativa es excelente, con una jugosidad y un aroma agradables.

FLORACION	ARBOL
Época: Media	Porte: Semi abierto
Floración: Media a buena	Vigor: Medio
Fertilidad: AUTOFÉRTIL	Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
Productividad: Buena
Entrada en producción: Media - 3^{era} hoja
Necesidades de frío: En estudio
Resistencia a la Sharka: No

FRUTO
Maduración: Semi precoz - semana 23
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 8-9
Calibre: 2A - 45-50 mm
Forma: Ovale
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 50% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 15° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2016-225
OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N° 2024/0073 el 16/01/2024.



Variedad semi precoz AUTOFÉRTIL. El potencial agronómico está elevado. Fruto muy bonito, liso y brillante. Su calidad gustativa está excelente, con una jugosidad y un aroma agradables.

FLORACION	ARBOL
Época: Media temporalda	Porte: Semi abierto
Floración: Buena	Vigor: Medio
Fertilidad: AUTOFÉRTIL	Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{nda} o 3^{era} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA

FRUTO
Maduración: Precoz - semana 23
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 8-9
Calibre: 2A - 45-50 mm
Forma: Elíptica
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Rojo anaranjado sobre 20-30% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Dulce - 14° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2019-540
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Domanda in corso.



Variedad de albaricoke rojo AUTOFÉRTIL. Muy buen potencial de carga y calibre. Fruto muy bonito, redondo, atractivo y brillante. Su calidad gustativa es buena, con una jugosidad y un aroma agradables.

FLORACION	ARBOL
Época: Media	Porte: Semi abierto
Floración: Buena	Vigor: Muy Fuerte
Fertilidad: AUTOFÉRTIL	Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{nda} o 3^{era} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA

FRUTO
Maduración: Temporalda - semana 24
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 8-9
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja oscuro
Sobreimpresión: Roja sobre 90% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Dulce - 15.5° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Muy buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

ES 20-93
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2024/0072 el 16/01/2024.

COCOT Cov



Esta variedad de albaricoque semiprecoz llega en la época de PERLE COT. AUTOFÉRTIL, su potencial agronómico es especialmente interesante (tonelaje, calibre), así como las cualidades de sus frutos, en particular su epidermis más resistente a las inclemencias meteorológicas y a las manchas.

FLORACION

Época: Muy precoz
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: RESISTENTE



FRUTO

Maduración: Temporada - semana 24
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja oscuro
Sobreimpresión: Roja sobre 30-50% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 14° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Muy buena - Menos de 10%
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2012-44

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 60805 el 21/03/2022.

DELICOT Cov



Variedad AUTOFÉRTIL, de temporada media, cuyo fruto presenta un bonito color rojo granate en el 50 % de su superficie. Su sabor es excelente. Muy buen potencial agronómico.

FLORACION

Época: Media
Floración: Media a buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi Abierto
Vigor: Media a Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3-4 – medias y altas
Resistencia a la Sharka: Tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA

FRUTO

Maduración: Temporada - semana 25
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 6-7
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Elíptica
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 60% del fruto
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 16° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

HYB 3-5

OBTENTOR: Marie-Laure ETEVE - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU48932 el 23/04/2018.

ROSIE COT Dcov



ROSIE COT es una variedad semi tardía, AUTOFÉRTIL, que produce muy bien en condiciones climáticas bastante cálidas. Además, su calidad gustativa es excepcional, jugosa, dulce y azucarada.

FLORACION

Época: Media tardía
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: No

FRUTO

Maduración: Semi tardía - semana 28-29
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7
Calibre: 3A/ 2A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja claro
Sobreimpresión: Roja sobre 10-30%
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 17° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

COT 82

OBTECTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2023/1133 el 25/05/2023.

JUSTO COT Cov



Esta variedad tardía llega durante la temporada FARELY, después de SWIRED y PLAYA COT. Su potencial agronómico es muy interesante y los frutos presentan una bonita coloración y buenas cualidades gustativas.

FLORACION

Época: Tardía
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Fuerte
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3-4 – medias y altas
Resistencia a la Sharka: RESISTENTE



FRUTO

Maduración: Semi tardía - semana 28
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Oblonga
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja Naranja sobre 20% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Dulce – 15° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2011-94

OBTECTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 60807 el 21/03/2022.

WINTER COT®
WIN 21 Dcov



Variedad de floración muy tardía y AUTOFÉRTIL. Se adapta muy bien a las zonas frías y con heladas. Su potencial agronómico es elevado, con una muy buena retención de los frutos en el árbol. El fruto tiene una muy buena calidad gustativa.

FLORACION

Época: Muy Tardía
Floración: Buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Muy fuerte
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{da} o 3^{era} hoja
Necesidades de frío: Zona 4-5 – Altas y muy altas
Resistencia a la Sharka: NO


FRUTO

Maduración: Tardía - semana 29
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7
Calibre: 2A/3A - 45-55 mm
Forma: Oval
Color de fondo: Naranja claro
Sobreimpresión: Roja clara sobre 20% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Buena – 15° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Media a buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

Win 21 Dcov

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2023/0173 el 18/01/2023.

WINNIE COT Cov



Variedad tardía, época FARBALY cov. AUTOFÉRTIL, tiene una producción importante y su fruto, de bonita presentación, tiene una excelente calidad gustativa y muy buena jugosidad.

FLORACION

Época: Media tardía
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3-4 – medias a altas
Resistencia a la Sharka: No

FRUTO

Maduración: Tardía - semana 29
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7-8
Calibre: 3A/ 2A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 50% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 18° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Muy buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

2013-112

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 70345 el 01/09/2025.

VAL COT Dcov



Variedad tardía y AUTOFÉRTIL. Su potencial agronómico es muy elevado, con un gran potencial de calibre. El fruto es atractivo, sólido y la epidermis es resistente. Su sabor y jugosidad son excelentes.

FLORACION

Época: Tardía
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Erguido
Vigor: Muy fuerte
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: RESISTENTE



FRUTO

Maduración: Muy tardía - semana 31
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 7-8
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Oval
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 10-30% del fruto
Dureza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 16° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas



2017-373

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE

EDITOR: COT INTERNATIONAL

PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2022/1971 el 23/08/2022.

COKLI COT Dcov



Variedad muy tardía y AUTOFÉRTIL. Su potencial agronómico es muy interesante, con un fruto que se mantiene mucho tiempo en el árbol. El fruto es atractivo, sólido y con una epidermis resistente. Su calidad gustativa es excelente, una de las mejores de la temporada.

FLORACION

Época: Tardía
Floración: Buena a muy buena
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno
Fructificación: Sobre todo tipo de ramas

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Muy rápida - 2^{da} hoja
Necesidades de frío: Zona 3 – medias
Resistencia a la Sharka: RESISTENTE



FRUTO

Maduración: Muy tardía - semana 32
Fase de cosecha: Código color CTIFL: 8-9
Calibre: 2A/3A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Color de fondo: Naranja
Sobreimpresión: Roja sobre 20-40% del fruto
Dureza: Fuerte - + de 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 22° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Muy buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas



2016-282

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE

EDITOR: COT INTERNATIONAL

PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2022/1970 el 23/08/2022.

NIMBA Cov



NIMBA es una cereza muy precoz y muy productiva. El fruto tiene una buena firmeza, de gran calibre y muy dulce.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S2 S3
Fertilidad: AUTOSTÉRIL.
Se poliniza con PACIFIC RED.

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{da} o 3^{ra} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Muy precoz - semana 19
Calibre: Medio a grande - 28-30 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 16° Brix; muy aromático
Tolerancia al cracking: Sensible - necesita una cobertura plástica
Conservación: Buena - 3 semanas

Código color CTIFL: 4



NIMBA

OBTENTOR: SMS UNLIMITED - CALIFORNIE - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Título UE 52231 el 28/03/2019.

PACIFIC RED Cov



PACIFIC RED es una cereza precoz, muy interesante para la época. El fruto es muy dulce, atractivo, de gran calibre y muy buena firmeza.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S4' S9
Fertilidad: AUTOFÉRTIL.
Puede polinizar NIMBA.

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Media - 3^{ra} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 20
Calibre: Medio a grande - 28-30 mm
Forma: Redondo
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Fuerte - + de 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Excelente - 5 semanas

Código color CTIFL: 4



PACIFIC RED

OBTENTOR: SMS UNLIMITED - CALIFORNIE - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Título UE 51941 el 28/03/2019.

FRISCO Cov



FRISCO es una cereza semi precoz, muy productiva y con una buena relación carga/calibre. Además, posee excelentes cualidades organolépticas. El fruto es muy firme y dulce.

FLORACION

Época: Media
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S1 S4'
Fertilidad: AUTOFÉRTIL.
Puede polinizar ROCKET y NIMBA.

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{da} o 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 20
Calibre: Medio a grande- 28-30 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix ; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Muy buena - 4 semanas

Código color CTIFL: 5



FRISCO

OBTENTOR: SDR FRUIT LLC, CALIFORNIE - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Título UE 42694 el 07/03/2016.

EARLY RED®



EARLY RED® Maraly es una cereza muy interesante por su periodo de maduración. El fruto es de gran calibre, muy firme y muy dulce.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S1 S9
Fertilidad: AUTOSTÉRIL.
Se poliniza con GIANT RED, NIMBA, RED PACIFIC, FRISCO, FOLFER, FERDOUCE.

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Fuerte

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Media - 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 20
Calibre: Medio a grande- 28-30 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 16° Brix ; muy aromático
Tolerancia al cracking: Sensible - necesita una cobertura plástica
Conservación: Buena - 3 semanas

Código color CTIFL: 5-6



MARALY COV

OBTENTOR: Marvin NIES, CALIFORNIE - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL / Pierre RIOU
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Título UE 12322 el 18/12/2003.

GIANT RED®



GIANT RED® Mariant es una cereza muy interesante por su calibre excepcional, su bonito aspecto y su firmeza. Tiene una gran productividad cada año y no es sensible a los inviernos suaves.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S1 S3
Fertilidad: AUTOSTÉRIL.
Se poliniza con EARLY RED,
FRISCO, FOLFER, FERDOUCE.

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: media
No plantar en portainjertos demasiado nanizantes.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{nda} o 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Semi precoz - semana 22
Calibre: Grande a muy grande - 32-34 mm
Forma: Redondo
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 16° Brix; muy aromático
Tolerancia al cracking: Sensible - necesita una cobertura plástica
Conservación: Buena - 3 semanas

Código color CTIFL: 4



MARIANT COV

OBTENTOR: Marvin NIES, CALIFORNIE - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL / Pierre RIOU
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Título UE 12320 el 18/12/2003.

EPICK® 16 Cov



EPICK 16 es una cereza muy interesante por su **AUTOFERTILIDAD** y su periodo de maduración posterior al de FRISCO. Además, el fruto es de buen tamaño, firme y muy dulce.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S1 S4'
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Muy buena
Entrada en producción: Rápida - 2^{nda} o 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 21
Calibre: Grande - 30-32 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 78 - 82 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Excelente - 5 semanas

Código color CTIFL: 5



SMS 16

OBTENTOR: SMS UNLIMITED CALIFORNIE - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Título UE 63431 el 20/03/2023.

SUN POP Dcov



Esta cereza es semi precoz y AUTOFÉRTIL. Es la primera variedad fruto de nuestro programa de hibridación. Se caracteriza por su gran potencial de calibre, su excelente sabor y su textura crujiente.

FLORACION

Época: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S1 S4'
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Entrada en producción: Media - 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – media

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 21
Calibre: Grande - 30-32 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 78 - 82 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 24° Brix ; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Muy buena - 5 semanas

Código color CTIFL: 6



COT 12-09

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCE

EDITOR: COT INTERNATIONAL

PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2021/2999 el 22/11/2021.

EPICK® 1

NEW



Esta nueva selección californiana precoz es muy interesante por su alto potencial productivo, sus frutos de muy buena calidad gustativa y su buena firmeza.

FLORACION

Época: Tardía
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S1 S9
Fertilidad: AUTOSTERIL,
se poliniza con SUN POP
o EPICK 16

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Buena
Entrada en producción: Media - 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Precoz - semana 21
Calibre: Medio a grande- 28-30 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 20° Brix ; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Muy buena - 4 semanas

Código color CTIFL: 6



SMS1

OBTENTOR: SMS UNLIMITED – USA

EDITOR: COT INTERNATIONAL

PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: Solicitud en curso.

COT 12-01 NEW



Esta nueva selección de COT INTERNATIONAL ocupa un lugar muy interesante en el periodo semiprecoz, después de SUN POP cov, y es también muy productiva. Los frutos son de buen calibre, firmes y muy dulces.

FLORACION

Época: Media
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S2 S3
Fertilidad: AUTOSTERIL,
se poliniza con SUN POP
y EPICK 1

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Buena
Entrada en producción: Media – 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Semiprecoz - semana 23
Calibre: Medio a gordo- 28-30 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 20.4° Brix; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Muy buena - 4 semanas

Código color CTIFL: 6



COT 12-01

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETA: Solicitud en curso.

SMS 311 NEW



Esta nueva selección californiana es autofértil, semiprecoz y se cosecha justo después de EPICK 16. El fruto tiene un bonito color, es muy dulce y tiene buena firmeza.

FLORACION

Época: Media tardía
Floración: Buena a muy buena
Aleles: S3 S4'
Fertilidad: AUTOFÉRTIL

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Medio

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

Productividad: Buena
Entrada en producción: Media – 3^{era} hoja
Necesidades de Frio: Zona 3 – medias

FRUTO

Maduración: Semiprecoz - semana 2
Calibre: Medio a gordo- 28-30 mm
Forma: Reniforme
Pedúnculo: Medio
Firmeza: Muy buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce – 21.2° Brix; muy aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Muy buena - 4 semanas

Código color CTIFL: 6-7



SMS 311

OBTENTOR: SMS UNLIMITED – USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL
PROTEZIONE DELLA VARIETA: Solicitud en curso.

FIFINE Dcov



Esta ciruela temprana presenta una excelente calidad gustativa, con frutos aromáticos, muy dulces y jugosos. Su coloración y calibre la hacen muy atractiva desde el inicio de la temporada.

FLORACION

Época de floración: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Sb - Sc
Polinizadores: DORINE y TITINE

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno

FRUTO

Época de maduración: Precoz - semana 26
Calibre: 2A - 45-50 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Rojo
Coloración del fondo: Rojo
Coloración de la carne: Naranja-rojo
Hueso: Adherente
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

PL 300

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2024/2062 el 29/08/2024.

PL 22-103

NEW



Esta ciruela semi precoz es muy interesante por sus frutos redondos, piel negra brillante y pulpa roja granate crujiente y jugosa: esta variedad combina un aspecto atractivo con un sabor dulce. Es muy firme y tiene un gran potencial de calibre.

FLORACION

Época de floración: Media temporada
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Estudio en curso
Polinizadores: Estudio en curso

ARBOL

Porte: Erguido
Vigor: Fuerte

FRUTO

Época de maduración: Precoz - semana 26
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Negro
Coloración del fondo: Rojo
Coloración de la carne: Rojo
Hueso: Semi adherente
Dureza: Fuerte - + de 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; textura fina; muy jugoso y aromático.
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

PL 22-103

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud en curso.

PL 304 **NEW**



Esta ciruela precoz de pulpa rojo-anaranjada tiene una excelente calidad gustativa, es jugosa y muy dulce. Piel granate muy atractiva, ligeramente lenticelada. Muy buen potencial de carga y calibre.

FLORACION

Época de floración: Tardía
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Sb - Sc
Polinizadores: COQUINE, TITINE

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno

FRUTO

Época de maduración: Precoz - semana 27
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Rojo
Coloración del fondo: Rojo
Coloración de la carne: Naranja-rojo
Hueso: Semi adherente
Dureza: Fuerte - + de 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; textura fina; muy jugoso y aromático.
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

PL 304

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
VARIETY PROTECTION: Solicitud en curso.

COQUINE Cov



Esta ciruela roja de pulpa roja llega a mediados de julio y presenta un muy buen nivel de rendimiento y calibre. La fruta tiene una bonita presentación y una buena calidad gustativa, dulce y jugosa.

FLORACION

Época de floración: Media a Tardía
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Se - Sh
Polinizadores: OCTOBER SUN y TITINE

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Fuerte

FRUTO

Época de maduración: Semi precoz - semana 28
Calibre: 3A/ 2A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Rojo
Coloración del fondo: Rojo
Coloración de la carne: Rojo
Hueso: Adherente
Dureza: Muy Buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Dulce - 13° Brix ; textura fina y jugosa
Tolerancia al cracking: Muy buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

PR1 N7

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 66218 el 08/04/2024.

PL 309 **NEW**



Esta ciruela muy productiva y sabrosa entra en la categoría de las «Cherry Plum».

FLORACION

Época de floración: Media tardía
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Sb - Sc
Polinizadores: COQUINE, TITINE, y DORINE

ARBOL

Porte: Erguido
Vigor: Fuerte

FRUTO

Época de maduración: Temporada - semana 29
Calibre: 2A/A - 40-45 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Purpurea
Coloración del fondo: Amarillo
Coloración de la carne: Amarillo
Hueso: Semi adherente
Dureza: Muy Buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 17° Brix; textura fina y crujiente; jugoso y aromático.
Tolerancia al cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

PL 309

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
VARIETY PROTECTION: Solicitud en curso.

DORINE Dcov



Esta ciruela de temporada presenta una excelente calidad gustativa, con frutos aromáticos, dulces y jugosos. Además, su coloración y calibre hacen que la fruta sea muy atractiva.

FLORACION

Época de floración: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Sc - Sh
Polinizadores: DIVINE, TITINE y GRENADINE

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno

FRUTO

Época de maduración: Semi precoz - semana 28
Calibre: 3A/ 2A - 45-55 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Bicolor amarillo dorado y rojo claro
Coloración del fondo: Amarillo
Coloración de la carne: Amarillo
Hueso: Semi adherente
Dureza: Buena - 70 - 75 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; textura fina; jugoso y con aromas de frutas exóticas
Tolerancia el cracking: Buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

PL 312

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Solicitud N°2023/1741 el 23/08/2023.

TITINE Cov



Esta ciruela presenta frutos de un bonito color púrpura homogéneo y excelente calidad gustativa. Su nivel agronómico es muy bueno, con una producción regular todos los años.

FLORACION

Época de floración: Precoz
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Sb - Sf
Polinizadores: GRENADINE, DIVINE, DORINE y COQUINE

ARBOL

Porte: Semi abierto
Vigor: Bueno


FRUTO

Época de maduración: Temporada - semana 31
Calibre: 3A - 50-55 mm
Forma: Redonda
Coloración principal: Rojo oscuro
Coloración del fondo: Amarillo
Coloración de la carne: Amarillo
Hueso: Libre
Dureza: Muy Buena - 75 - 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 18° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Media
Conservación: Muy buena - 4 semanas

CAS SP1

OBTENTOR: SDR FRUIT LLC - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 41120 el 08/06/2015.

GRENADINE Cov



Esta ciruela de mitad de agosto presenta un rendimiento y un calibre muy elevados. Además, la fruta tiene una excelente calidad gustativa y mucho aroma.

FLORACION

Época de floración: Muy precoz
Floración: Buena a muy buena
Alelos: Se - Sc
Polinizadores: TITINE, DIVINE y DORINE

ARBOL

Porte: Abierto
Vigor: Bueno

FRUTO

Época de maduración: Temporada - semana 33
Calibre: 4A - 55-60 mm
Forma: Oval
Coloración principal: Rojo oscuro
Coloración del fondo: Amarillo
Coloración de la carne: Amarillo
Hueso: Libre
Dureza: Fuerte - + de 80 Durofel
Calidad gustativa: Muy dulce - 16° Brix; textura fina; jugoso y aromático
Tolerancia al cracking: Muy buena
Conservación: Muy buena - 4 semanas

CAS 10

OBTENTOR: SDR FRUIT LLC - USA
EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA
PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 40660 el 20/04/2015.

DIVINE Cov



Esta ciruela de finales de agosto presenta un buen nivel de rendimiento y calibre. Fruta muy atractiva por su color rosa oscuro y brillante. Su sabor es excepcional, muy crujiente, aromático y dulce.

FLORACION

Época de floración: Precoz

Floración: Buena a muy buena

Alelos: Sb - Sc

Polinizadores: TITINE y DORINE

ARBOL

Porte: Semi abierto

Vigor: Bueno

FRUTO

Época de maduración: Temporada - semana 34

Calibre: 3A - 50-55 mm

Forma: Semi redonda

Coloración principal: Rojo luminoso

Coloración del fondo: Amarillo

Coloración de la carne: Amarillo

Hueso: Semi adherente

Dureza: Fuerte - + de 80 Durofel

Calidad gustativa: Muy dulce - 19° Brix; textura fina; jugoso y aromático

Tolerancia al cracking: Muy buena

Conservación: Excelente - 5 semanas y +

PR2 N4

OBTENTOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA

EDITOR: COT INTERNATIONAL - FRANCIA

PROTECCION DE LA VARIEDAD: Título EU 40660 el 20/04/2015.





Albaricoque
Almendra

CEBAS RED®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Alto
 Porte: Semicerrado
 Autocompatible: Si
 Productividad: Elevada
 Nivel de aclareo: Medio
 Fecha Floración: -18 febrero
 Resistencia a Sharka: si

Fruto

Fecha maduración: -30 abril
 Peso medio: 64 g
 Firmeza: Muy Alta
 Color de Piel: Naranja intenso (chapa roja)
 Color de pulpa: Naranja
 Contenido en azúcares: 11,3º Brix
 Acidez: 1,34 g/100 ml

CEBAS GOLD®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Alto
 Porte: Semicerrado
 Autocompatible: Si
 Productividad: Elevada
 Nivel de aclareo: Medio
 Fecha Floración: -20 febrero
 Resistencia a Sharka: Sí, PPV-D

Fruto

Fecha maduración: -16 Mayol
 Peso medio: 77,5 g
 Firmeza: Alta
 Color de Piel: Naranja intenso (chapa roja)
 Color de pulpa: Naranja
 Contenido en azúcares: 12,3º Brix
 Acidez: 1,30 g/100 ml

DORADA®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Muy Alto
 Porte: Semi-abierto
 Autocompatible: Si
 Productividad: Elevada
 Nivel de aclareo: Medio-alto
 Fecha Floración: -15 marzo
 Resistencia a Sharka: No (tolerancia en fruto)

Fruto

Fecha maduración: -25 junio
 Peso medio: 73,1 g
 Firmeza: Alta
 Color de Piel: Amarillo (chapa anaranjada)
 Color de pulpa: Naranja claro
 Contenido en azúcares: 13,1º Brix
 Acidez: 1,25 g/100 ml Excelente aptitud para la conserva

MIRLO ANARANJADO®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Alto
 Porte: Semi-abierto
 Autocompatible: Si
 Productividad: Elevada
 Nivel de aclareo: Bajo
 Fecha Floración: -23 febrero
 Resistencia a Sharka: si

Fruto

Fecha maduración: -13 mayo
 Peso medio: 75,2 g
 Firmeza: Alta
 Color de Piel: Naranja claro (chapa roja)
 Color de pulpa: Naranja claro
 Contenido en azúcares: 13,4º Brix
 Acidez: 1,28 g/100 ml

ALBARICOQUE

MURCIANA®



VALORANGE




CARACTERÍSTICAS

Árbol	Fruto
Vigor: Muy Alto	Fecha maduración: ~4 junio
Porte: Semi-abierto	Peso medio: 65 g
Autocompatible: Si	Firmeza: Alta
Productividad: Elevada	Color de Piel: Naranja (chapa roja)
Nivel de aclareo: Alto	Color de pulpa: Naranja
Fecha Floración: ~4 marzo	Contenido en azúcares: 12,5º Brix
Resistencia a Sharka: si	Acidez: 0,9 g/100 ml Excelente aptitud para la conserva

CARACTERÍSTICAS

Árbol	Fruto
Vigor: Muy Vigoroso	Fecha maduración: ~4 junio
Porte: Semi-abierto	Peso medio: 70 g
Autocompatible:	Firmeza: Alta
Productividad: Elevada	Color de Piel: Amarillo (chapa roja)
Nivel de aclareo: Alto	Color de pulpa: Naranja
Fecha Floración: ~3 marzo	Contenido en azúcares: 14,3º Brix
Resistencia a Sharka: Alta	Acidez: 1,50 g/100 ml


TABLA DE FLORACIÓN Y MADURACIÓN DE ALMENDROS CEBAS-CSIC



* Datos referidos a Baza (Granada) a 850 metros de altitud

* Todas las variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el CSIC

TABLA DE FLORACIÓN Y MADURACIÓN DE ALBARICOQUEROS CEBAS-CSIC



* Datos referidos a Cieza (Murcia) a 270 metros de altitud

* Todas las variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el CSIC

ANTOÑETA®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Elevado
 Porte: Abierto
 Ramificación: Abundante
 Productividad: Muy Elevada
 Resistencia Enfermedades: Media
 Época de Floración: Tardía
 Autocompatibilidad: Si (Genotipo S1Sf)
 Autofertilidad: Elevada

Fruto

Dureza de la cáscara: Dura
 Rendimiento medio: 35%
 Peso Medio: 1,5 g
 Forma de la Almendra: Redondeada
 Semillas dobles: 0%
 Aspecto de la Almendra: Muy atractivo
 Época de maduración: Muy Temprana
 Facilidad de recolección: Muy buena
 Caída de los frutos maduros: No

MARTA®



CARACTERÍSTICAS


Árbol

Vigor: Elevado
 Porte: Erecto
 Ramificación: Equilibrada
 Productividad: Elevada
 Resistencia Enfermedades: Buena
 Época de Floración: Tardía
 Autocompatibilidad: Si (Genotipo S1Sf)
 Autofertilidad: Elevada

Fruto

Dureza de la cáscara: Dura
 Rendimiento medio: 32%
 Peso Medio: 1,2 g
 Forma de la Almendra: Alargada
 Semillas dobles: 0%
 Aspecto de la Almendra: Muy atractivo
 Época de maduración: Muy Temprana
 Facilidad de recolección: Muy buena
 Caída de los frutos maduros: No

MAKAKO®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Elevado
 Porte: Semi-erecto
 Ramificación: Equilibrada
 Productividad: Muy Elevada
 Resistencia Enfermedades: Buena
 Época de Floración: Extra-tardía
 Autocompatibilidad: Si (Genotipo S5Sf)
 Autofertilidad: Elevada

Fruto

Dureza de la cáscara: Dura
 Rendimiento medio: 33%
 Peso Medio: 1,2 g
 Forma de la Almendra: Elíptica
 Semillas dobles: 0%
 Aspecto de la Almendra: Atractivo
 Época de maduración: Temprana
 Facilidad de recolección: Muy Buena
 Caída de los frutos maduros: No

PENTA®



CARACTERÍSTICAS

Árbol

Vigor: Intermedio
 Porte: Equilibrado
 Ramificación: Equilibrada
 Productividad: Elevada
 Resistencia Enfermedades: Buena
 Época de Floración: Extra-tardía
 Autocompatibilidad: Si (Genotipo S1Sf)
 Autofertilidad: Elevada


Fruto

Dureza de la cáscara: Dura
 Rendimiento medio: 30%
 Peso Medio: 1,0 g
 Forma de la Almendra: Alargada
 Semillas dobles: 0%
 Aspecto de la Almendra: Atractivo
 Época de maduración: Temprana
 Facilidad de recolección: Muy buena
 Caída de los frutos maduros: No


frutimí)

Paraguay
Nectarina plana
Melocotón rojo
Melocotón blanco
Melocotón amarillo
Nectarina amarilla

Fichas de variedades de melocotón 2024



Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo empleadas por el productor. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Paraguayo	Amarilla	Subácido	75	1º febrero	1º mayo	25,72

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
82	65	B	4,2	11,5	3,4

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Siroco 8®

Paraguayo de
carne blanca

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Siroco 5							
Siroco 8		 Floración			 Recolección		
Siroco 30							
Siroco 43							
Siroco 50							

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Paraguayo	Blanca	Subácido	82	2º febrero	1º mayo	27,04

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
125	72	A	3,5	11,1	4,1


Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Siroco 30®

Paraguay de
carne blanca

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Siroco 5							
Siroco 8							
Siroco 30		Floración			Recolección		
Siroco 43							
Siroco 50							

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Paraguay	Blanca	Subácido	90	3ª febrero	4ª mayo	31,80

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
145	75	A-AA	4,3	12,2	2,5

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Siroco 5							
Siroco 8							
Siroco 30							
Siroco 43			Floración			Recolección	
Siroco 50							

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Paraguayo	Blanca	Subácido	97	4ª febrero	3ª junio	36,87

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
157	76	AA	4,5	13,5	2,4

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Paraguayo	Blanca	Subácido	90	4ª febrero	4ª junio	37,46

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
205	85	AA	4,4	12,3	2,7

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Alisio 20®

Melocotón rojo de
carne amarilla

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Alisio 15						
Alisio 20		Floración			Recolección	
Alisio 22						
Alisio 30						

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Melocotón rojo	Amarilla	Equilibrado	75	4º enero	1ª mayo	20,90

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
165	70	A	3,8	10,3	8,3

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Alisio 22®

Melocotón rojo de
carne amarilla

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Melocotón rojo	Amarilla	Equilibrado	90	4ª enero	2ª mayo	ND

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
160	70	A	4,2	10,6	10,4

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Alisio 30®

Melocotón rojo de
carne amarilla

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Melocotón rojo	Amarilla	Subácido	90	1ª febrero	4ª mayo	29,60

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm ²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
250	76	AA	3,8	13,1	3,2


Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Poniente 30[®]

Melocotón rojo de
carne blanca

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Poniente 30			Floración			Recolección
Poniente 40						

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Melocotón rojo	Blanca	Subácido	80	3ª febrero	3ª mayo	36,14

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm ²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
190	71	A	3,5	12,2	2,7

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Poniente 40®

Melocotón rojo de
carne blanca

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Poniente 30						
Poniente 40		Floración			Recolección	

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Melocotón rojo	Blanca	Subácido	88	3ª febrero	1º junio	27,76

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
235	76	AA	3,4	11,9	2,6

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Levante 5[®]

Melocotón amarillo pavía

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Levante 5		 Floración			 Recolección	
Levante 45						

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Pavía	Amarilla	Equilibrado	30	2ª febrero	2ª mayo	25,02

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
158	69	A	2,8	11,8	7,6

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es



Levante 45®

Melocotón amarillo pavía

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Levante 5						
Levante 45		Floración			Recolección	

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Pavía	Amarilla	Equilibrado	15	2ª febrero	2ª junio	26,60

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
295	83	AAA-AAAA	2,8	13,2	5,6


Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Bora 20®

Nectarina de
carne amarilla

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Bora 20		 Floración			 Recolección	
Bora 30						

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Nectarina	Amarilla	Subácido	95	2ª febrero	2ª mayo	29,32

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
160	67	A	3,6	12,6	5,3

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Bora 30®

Nectarina de
carne amarilla

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Bora 20						
Bora 30		Floración				Recolección

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Nectarina	Amarilla	Subácido	95	2ª febrero	4ª mayo	30,75

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
165	69	A	4,2	14,6	4,3

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

Mistral 30®

Nectarina plana de
carne amarilla

frutimida

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Medioambiental



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Mistral 30			 Floración			 Recolección

Tipología	Color carne	Gusto	Sobre color rojo (%)	Inicio floración (semana)	Inicio maduración (semana)	Necesidades de frío (Porciones)
Nectarina plana	Amarilla	Subácido	97	1ª marzo	2ª junio	39,72

Peso (g)	Calibre (mm)	Categoría	Dureza (kg/cm²)	°Brix	Acidez (meq/l málico)
140	74	A-AA	5,3	13,2	3,9

Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciados para su venta en www.imida.es

VARIEDADES DE MELOCOTÓN 2026

FRUTIMIDA

Abril		Mayo			Junio		Julio
	 Siroco 5	 Siroco 8			 Siroco 35	Paraguayos y platerinas  Siroco 43  Siroco 50	
	 Aliso 15	 Aliso 20	 Aliso 22	 Aliso 30			
			 Poniente 30		 Poniente 40		Melocotones rojos de carne blanca
		 Levante 5	 Levante 25	 Levante 35	 Levante 45	 Levante 50	Melocotones pavía
	 Bora 20		 Bora 30		 Bora 40		Nectarinas amarillas



Las fechas y datos prometido están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo empleadas por el productor. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMIDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciadors para su venta en www.imida.es



VARIEDADES DE MELOCOTÓN 2026


FRUTIMIDA

Variedad	Tipología	Color carne	Floración inicio (semana)	Necesidades de frío (Porciones)	Sobrecolor rojo (%)	Peso fruto (g)	Calibre (mm)	Calibre	Dureza (kg/cm ²)	Azucar (°Brix)	Acidez (meq/l málico)
Siroco 5 ®	Paraguayo	Amarilla	2ª febrero	25,7	75	82	65	B	4,2	11,5	3,4
Siroco 8 ®	Paraguayo	Blanca	3ª febrero	30,3	82	125	72	A	3,5	11,1	4,1
Siroco 35 ®	Paraguayo	Blanca	3ª febrero	28,2	90	147	73	AA	4,3	12,4	4,1
Siroco 43 ®	Paraguayo	Blanca	1ª marzo	36,9	97	157	76	AA	4,5	13,5	2,4
Siroco 50 ®	Paraguayo	Blanca	1ª marzo	36,8	90	205	85	AAA	4,4	12,3	2,7
Mistral 30 ®	Platerina	Amarilla	1ª marzo	40,4	97	140	74	A	5,3	13,2	3,9
Alisio 15 ®	Melocotón rojo	Amarilla	4ª enero	22,6	80	138	65	B	3,6	10,5	9,5
Alisio 20 ®	Melocotón rojo	Amarilla	4ª enero	20,9	75	165	70	A	3,8	10,3	8,3
Alisio 22 ®	Melocotón rojo	Amarilla	4ª enero	ND	90	180	75	AA	4,5	10,6	10,4
Alisio 30 ®	Melocotón rojo	Amarilla	3ª febrero	29,6	90	230	76	AA	3,8	13,1	3,2
Poniente 30 ®	Melocotón rojo	Blanca	3ª febrero	36,1	80	190	71	A	3,5	12,2	2,7
Poniente 40 ®	Melocotón rojo	Blanca	3ª febrero	27,8	88	235	76	AA	3,4	11,9	2,6
Levante 5 ®	Pavía	Amarilla	2ª febrero	25	30	158	69	A	2,75	11,8	7,6
Levante 25 ®	Pavía	Amarilla	1ª febrero	20,5	0	183	70	A	3,1	14,2	10,8
Levante 35 ®	Pavía	Amarilla	2ª febrero	25,5	0	272	82	AAA	3,3	13,1	6,1
Levante 45 ®	Pavía	Amarilla	3ª febrero	26,6	15	295	83	AAA	2,8	13,2	5,6
Levante 50 ®	Pavía	Amarilla	1ª marzo	28,9	0	298	82	AAA	3	14	7,7
Bora 20 ®	Nectarina	Amarilla	2ª febrero	29,3	95	150	65	B	3,6	11,6	4,8
Bora 30 ®	Nectarina	Amarilla	3ª febrero	30,7	95	165	69	A	4,2	14,6	4,3
Bora 40 ®	Nectarina	Amarilla	3ª febrero	ND	95	195	75	AA	3,8	14,5	3,3



Las fechas y datos promedio están referidos a la Finca experimental localizada en La Hoya del Campo (Murcia, España) a 173 m de altitud. Esta información puede variar dependiendo de las condiciones climáticas del año y de las técnicas de cultivo empleadas por el productor. Estas variedades están registradas y sólo pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el IMDA. Más información de las variedades, de los viveros multiplicadores y licenciadors para su venta en www.frutimida.es





viveros
del sureste







viveros del sureste



Ctra. de Granada, Km 10'5
30412 BARRANDA - CARAVACA (Murcia)
Telf. y Fax: 968 725 228
Móviles: 636 955 830 - 638 917 277
e-mail: info@viverosdelsureste.com
www.viverosdelsureste.com



SOCIO FUNDADOR DE VIVERMUR
VIVERO SELECCIONADOR



PSB Producción Vegetal
BUFFAT'S GENETICS



EMA GOLDEN
TREASURE

